

輔酵素型 B₁₂ 製劑

貧血、維他命 B₁₂ 缺乏補養劑

“正和”血保脈膠囊

Cobamamide Capsules “C.H.”

Cyanocobalamin、Hydroxocobalamin 等一般 B₁₂ 製劑在生體內作用必須先轉化成輔酵素型，且在體內轉化的利用率非常低。本品係輔酵素型 B₁₂，不須再經轉化即可直接被人體所利用，效果迅速且利用率高，具有高度的組織親和性，在肝臟的集積度非常高，在尿中排泄慢，在生體內貯留的時間長，故又稱為長效活性 B₁₂。

本品直接與 Homoglobin 的生合成、核酸蛋白質的生合成、SH 基的活性化、及 Transmethylation 等重要的代謝作用有關，具有神經修復作用、抗貧血作用、蛋白同化作用、抗 Histamine 作用、發育促進作用等的臨床效率。本品毒性低為輔酵素型 B₁₂，存在體內殆無毒性，惡性貧血患者或病後、手術後之回復可長期使用。

【成分】每顆膠囊含：

Cobamamide 500 mcg

【賦形劑】

膠囊內容物：

Dried Potato starch、Lactose Monohydrate、Colloidal Silicon dioxide、Magnesium stearate

膠囊殼：

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Purified Water、Titanium Dioxide、New Coccin
、Brilliant Blue FCF

【適應症】

惡性貧血、出血性貧血、具有神經合併症之惡性貧血、巨紅血球性貧血、巨胚紅血球性貧血、維他命 B₁₂ 缺乏症。

【用法用量】

通常成人每日 500~1500 mcg（1~3 粒）分 1~3 次服用，視年齡症狀適宜增減。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】1.偶有嘔吐、噁心、食慾不振、胃部不快感等症狀出現。

2.若發現有過敏症狀，須停用。

3.易受光分解，須遮光保存之。

【包裝】2~1000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

【儲存】儲存於 25℃ 以下，避光存放。

衛署藥製字第 019984 號



PIC/S GMP

正和製藥股份有限公司新營廠

台南市新營區嘉芳里新工路23號(新營工業區)