

“信東” 驅風錠 0.5公絲(秋水仙鹼)

Colchicine Tablets 0.5 mg "S.T."

Reg No. 041316

〔組成〕

每錠中含有 Colchicine.....0.5 mg

〔適應症〕

痛風。

〔用法用量〕

本藥須由醫師處方使用。

通常成人1日 Colchicine 3-4mg 分六—八次口服，但依年齡、症狀應適量增減之。預防發病時，通常成人一日 Colchicine 0.5-1mg，有發作之預感時，一次 0.5mg 口服。

註一：發現痛風發作時，應及早開始服用，效果較佳。

註二：作預防之長期投與，可能會有血液障害，生殖器障害，肝、腎障害、脫毛等嚴重副作用發生，如非必要之長期投與，不宜推薦使用。

〔使用上注意事項〕

一、一般注意事項：

(一)大量使用或誤用時，在服用後數小時內就會引起下列中毒症狀，故應遵守用法、用量規定：

噁心、嘔吐、腹痛、激烈下痢、咽頭、胃、皮膚之灼熱感、血管障害、休克、血尿、少尿，明顯的肌肉脫力感，中樞神經系之上行性麻痺、譫妄、痙攣、呼吸抑制而導致死亡。

1. 治療痛風的發作，一次投與0.5mg就會緩解疼痛之發作，一直到下痢、嘔吐等胃腸障礙發生為止，每3-4小時投與一次，一日量以3-4mg為限。

2. 為避免副作用之發生，要比產生胃腸障礙的劑量再減少0.5-1.0mg投與。

(二)由於長期投與，有時會引起血液障害、肝、腎障害等，用於預防疼痛發作時，請注意作尿檢，末梢血檢查(特別是白血球)以及肝功能的定期檢查。

二、下列患者請慎重投與：

老年人，身體非常衰弱之患者(特別是有腎疾病、胃腸疾病和心臟疾病的患者)。

三、副作用：

(一)長期投與：有時會有再生不良性貧血、顆粒球減少、白血球減少、血小板減少、脫毛、皮疹、肌肉病變，末梢神經炎、血尿、少尿等症狀發生，應仔細觀察。如有這些症狀發生，應即停止投與。

(二)過敏症：有時會有全身搔癢、發疹、發熱等症狀發生，應仔細觀察，如有這些症狀發生，應即停止投與。

(三)胃腸：有時會有下痢、噁心、嘔吐、腹痛、腹部痙攣等較嚴重的胃腸障害發生，應仔細觀察，如有這些症狀發生，應做減量投與或暫時停藥等的處理。

(四)其他：有時會有脫力感現象發生。

四、孕婦的投與：

動物實驗中有催畸形作用之報告，孕婦或可能懷孕之婦女，以不投與為原則。

五、其他：

男性服用本劑時，其配偶有可能生出Down's Disease及其他先天性異常兒之報告。

〔保管上注意事項〕

避光保存(日光直接照射會變質)。

〔包裝〕

12-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝

衛署藥製字第 041316 號 G-5802



信東生技股份有限公司
桃園市介壽路 22 號