

咳利寧液

Colin Solution

生達咳利寧液含有抗組織胺，可以緩解過敏症狀。本品由含鎮咳作用之中西藥物配製而成，為鎮咳祛痰之用藥。

成分：每ml中含有：

Chlorpheniramine maleate.....	0.4mg
Platycodon Fl. Ext.....	0.012ml
Polygala Fl. Ext.....	0.012ml
Glycyrrhizine.....	0.5mg

適應症：鎮咳祛痰（由支氣管炎、咽喉頭炎等所引起之咳嗽及喀痰）。

用法用量：成人每次5ml，一日3~4次，6~12歲兒童減半。醫師藥師藥劑生指示藥品

注意事項：

注意：1.有可能會引起睡意，故服用時應注意不可駕車或從事具危險性之機械操作工作。
2.本品含桔梗、遠志等中藥成分，故可能會產生微細沈澱，使用前搖勻，即可安心服用。

禁忌：1.綠內障患者。

2.前列腺肥大等尿路閉塞性患者。

副作用：本品副作用較其他抗組織胺輕微，但過量服用仍可能引起下列不良反應：

- 1.過敏症：有時會出現發疹等之過敏症狀則要中止投與。
- 2.泌尿器：有時會出現多尿、排尿困難等症狀。
- 3.精神、神經系：神經過敏、頭痛、焦躁感、複視，及有時會出現輕微嗜睡等症狀。
- 4.消化器：有時會出現口渴、胸悶等症狀。
- 5.血液：偶而出現血小板減少，無顆粒球症，再生不良貧血等症狀，所以要仔細的觀察，如有此現象時要中止投與。

孕婦：關於孕婦的投與，因尚未確認其安全性，故對於孕婦或有可能懷孕之婦女，僅在判斷其有益性高過危險性的情況下方予投與。

相互作用：因本品在與下列藥品併用時或攝取Ethanol時，會增強其相互作用，故應小心投藥或減量（*如與中樞神經抑制劑、MAO抑制劑併用時，會增強Anticholinergic作用）

賦形劑：Dehydroacetate Sodium、Citric Acid Anhydrous、Sodium Bicarbonate、Menthol、Alcohol 95%、Caramel、Sucrose、Cochineal Red A、Strawberry Oil、Water Purified

包裝：30~4000ml塑膠瓶裝

儲存：請貯存於25℃以下乾燥陰涼處。

衛署藥製字第031011號 Code No. LC-06 3214070