

"柏理"

乙酸可體松錠 25毫克

Cortisone Acetate Tablets 25mg "Pine Lawer"

【成分】每錠含

Cortisone Acetate 25mg

賦形劑：

Starch, Lactose, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Purified Water.

【適應症】

風濕性關節炎、急性風濕熱、過敏性病、炎症性眼病、皮膚病、贅生性疾病及阿迪生氏病。

【用法/用量】

服用本品應在醫師指導下使用，患者應逐日仔細視察，當其對可體松能完全發揮療效時，應即調整維持劑量，治療期間應經常測量血壓與體重，小便檢驗，心動電流圖與血球計算，有時視需要而應作血糖，二氧化碳結合力及血內電解質之測定。

- 1.類風濕性關節炎之劑量：每24小時內給100mg (即四片分成二至四次服用)，連用二星期或至療效出現為止，然後逐漸減低劑量，每次減5mg或更多些，一直調節至最小合適之維持劑量，(最理想者為每日使用50-75mg.或少於此量)。
- 2.急性風濕熱之劑量：第一天給400mg.分成數次服用，以後每天200mg.也分成數次服用，直至療效出現，即改用每天50mg.，或少於此量的維持劑量續服6-8星期。
- 3.阿迪生氏病之劑量：每日10-25mg.，佐以4-9克之氯化鈉，或1-3mg.之Desoxycorticosterone Acetate，以維持血內電解質之量而使病況進步。
- 4.治療其他各病之劑量與類風濕性關節炎之用量相似，不過對於腎上腺性徵異常症之用量應視個別之需要不同而定，而喉頭水腫及嚴重哮喘須用大劑量(第一二天為300至500mg.)，以後即用維持劑量或停藥，慢性哮喘患者須長期使用，療效顯著。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 1.心臟儲存血量減少，充血性心臟衰竭、高血壓、精神病傾向、糖尿病、腎機能不足、久病健康不良、胃潰瘍、衰老、最近手術以後如腸吻合術，有活動性或可疑性癒合之結核病灶時，暫時不要應用本劑，於其他急性或慢性細菌炎症時，本品可以使用，但須併用抗生素及化學療法。
- 2.限制鈉鹽之攝取、矯正低鉀血症。
- 3.結核病、活動性或消化性潰瘍患者應禁用。
- 4.需控制血糖過高，故高血壓、糖尿病患者服用應多加注意。
- 5.避免身心過度疲勞，如發現有副作用(如失眠、多毛、粉刺等)產生時需暫時停藥。
- 6.除去阿迪生氏症及其他必要條件，本劑不能與其他荷爾蒙劑併用。
- 7.急性及慢性傳染炎症服用本劑時，應同時治療傳染病灶。

【包裝】

2-1000錠塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

【儲存條件】

保存於30℃以下為佳，避光儲存之。



委託者：柏理貿易股份有限公司

地 址：台北市104松江路65號4樓

訂貨專線：02-2500-6378 / 傳真：02-2503-7755

製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠

地 址：台南市新市區中山路182號