

"元宙" **喘咳定** 錠
Cosaten Tablets "Y.C."

【簡 介】本劑主成份 orciprenaline sulfate 為一合成之支氣管擴張劑，為選擇性作用於 β_2 接受器之交感神經樣胺，可鬆弛支氣管平滑肌之痙攣。本劑另一主成份 bromhexine HCl 為一痰排出劑，可溶解氣管之黏液及痰液，使其黏稠度降低而易於排出，使呼吸順暢。

【成 分】Each tablet contains:
Bromhexine HCl..... 8 mg
Metaproterenol sulfate (Orciprenaline sulfate)..... 20 mg

【適 應 症】急、慢性氣管炎、支氣管炎、支氣管性氣腫、支氣管疾患及感冒所導致之喀痰、呼吸困難、支氣管氣喘及氣喘性肺、支氣管疾患。

【用法用量】通常成人一天一錠，一日3~4次口服。
依年齡症狀酌予增減。
本藥須由醫師處方使用。

【警語及注意事項】有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑(erythema multiforme)、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(Stevens-Johnson syndrome <SJS>/toxic epidermal necrolysis <TEN>)、急性廣泛性發疹性膿疱症(acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>)等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含 bromhexine 成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀(如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛)。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

【副 作 用】長期服用高劑量時偶有發抖、心悸、頭痛之現象，此時停藥即可使此現象消失。並可以同時服用 KCl 而預防之。

【不良反應】免疫系統疾患：
罕見：過敏反應(hypersensitivity reactions)
頻率未知：過敏性反應(anaphylactic reactions)(包括：過敏性休克、血管性水腫、癢症)
皮膚及皮下組織疾患：
罕見：皮疹、蕁麻疹
頻率未知：嚴重皮膚不良反應(包括：多形性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿疱症)

【賦 形 劑】Starch、Povidone K-30、Microcrystalline cellulose (Avicel-101)、Stearic acid、Lactose monohydrate、Sodium starch glycolate (Primogel)、Tartrazine aluminum lake、Silicon dioxide hydrated。

【儲 存】於25℃以下儲存，請存放於陰涼處，避免日光直射及兒童伸手不及處。

【包 裝】6-1000錠PTP鋁箔盒裝、HDPE塑膠瓶裝。



元宙化學製藥股份有限公司

南投市南崗工業區南崗三路272號 MADE IN TAIWAN

☎ 049-2253190

服務時間8:00~17:00 (例假日除外)

網址<http://www.yuanchou.com.tw>