

"瑞安" **祛 喘** 膠囊
(可多替芬) 1毫克
"Purzer" **Defen** Capsule
(Ketotifen) 1 mg

瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

PIC/S GMP

衛署藥製字第034358號

GMP優良藥品 G-2528號

本藥須由醫師處方使用

本劑主含Ketotifen，是一種具有特殊的抗過敏作用(Anti-allergic Action)與抗組織作用。本劑具有下列特殊的抗過敏之藥理作用：

- 1.能抑制由血小板活化因子(PAF, Platelet Activating Factor)所引起的急性支氣管收縮反應及PAF所造成氣管過度反應。
- 2.能抑制由PAF所引起嗜伊紅血球(Eosinophil)在氣管的聚積。
- 3.能抑制化學介質(Chemical Mediator)如組織胺(Histamine)與SRS-A的釋放。
- 4.能拮抗由SRS-A所引起的急性支氣管收縮反應。
- 5.可預防及糾正Isoprenaline的減效反應(Tachyphylaxis)。
- 6.長期服用本劑，可顯著降低支氣管對乙酰膽鹼(Acetylcholine)的過度反應。

此外，本劑亦具強效及持續性的 H_1 -接受體阻斷作用(H_1 -Receptor Blocking Activity)。

口服本劑的吸收完整，約經2~4小時即可達到最高血中濃度，在人體內代謝後大部份以代謝物由尿液中排出體外。

【成 分】

Each Capsule Contains:

Ketotifen(as Fumarate) 1 mg

賦形劑：

膠囊內容物：Lactose Monohydrate, Corn Starch, Magnesium Stearate

膠囊外殼：Gelatin Capsule No. 4 (Red/White)(衛署藥製字第026828號)

【適 應 症】

支氣管性氣喘、變態反應性支氣管炎、乾草熱引起之哮喘、變態反應性鼻炎、變態反應性皮膚反應。

【用法用量】

成人：每天2次，每次1粒，早晚用餐時服用，對於鎮靜作用比較敏感的成人，宜採漸進方式服用本劑，即先每天1次，於睡前服用1粒，連續服用3至4天後，再增加劑量至每天2次，每次1粒。

6個月至3歲孩童：每天2次，每次半粒(0.5 mg)。

3足歲或3足歲以上孩童：每天2次，每次1粒，早晚用餐時服用。

【禁 忌】

對Ketotifen有過敏病史者禁用本劑。

【注意事項】

1.孕婦及腎或肝功能受損的患者宜小心使用本劑。

2.除非在醫師的照料下，否則不宜突然停止本劑的治療，以免加劇氣喘狀況。

3.本劑與安眠藥、鎮靜劑、抗組織胺製劑，或酒精併用時，會增強效果，小心使用。

4.本品應放置在孩童無法取得的地方。

【副作用】

本劑極為安全，副作用極為罕見，偶有鎮靜、倦睡、口渴、眩暈、眼球震顫、或定向感障礙的情況發生。

【儲存條件】

本品應於室溫下避光貯存。

【包裝種類】

4~1000粒瓶裝、鋁箔盒裝。

瑞 安 大 藥 廠 股 份 有 限 公 司

地 址：台北市松山區光復南路1號12樓之2

製 造 廠：瑞安大藥廠股份有限公司觀音廠

廠 址：桃園市觀音區草漯里大同一路26號

服務電話：(02)2766-0887

C0104502