

中國化學

迪心贊錠 30 公絲(鹽酸迪太贊)

Diltisser Tablets 30mg “C.C.P.”

(Diltiazem HCl)

網號：

C38

【成分名 (中文名)】Diltiazem HCl (鹽酸迪太贊)

【劑型、含量】

成 份：Each Tablet contains：Diltiazem HCl.....30mg

【臨床藥理】

1.Diltiazem HCl 是一種鈣離子拮抗劑，其藥理特性相似於 Nifedipine，主要作用為抑制心臟血管系統細胞外鈣離子的注入，擴張血管，增加冠狀血流量(但並不改變血液中鈣離子濃度)，同時抑制心肌及血管平滑肌的收縮，擴張冠狀血管末梢血管，降低血壓減少心臟負荷。

2.吸收、分佈、代謝：口服本藥之生體可用率(比較注射而言)為40%。本藥大部份經由肝臟代謝，有 2~4% 以未改變之形式經由尿排泄。本藥有 70~80%會和血漿蛋白結合。口服本藥 30~120mg 後，30~60 分鐘內可在血漿中測得，而在 2~3 小時內可得最高血中濃度。本藥口服單一或多次劑量其血中半衰期約為 3.5 小時。本藥代謝物 desacetyl diltiazem 大約佔有 10~20%，其冠狀動脈擴張之強度約為 Diltiazem 的 25~50%。本藥之治療血中濃度範圍為 50~200ng/ml。尚無資料顯示本藥之排泄或代謝物會對肝或腎有損傷。

【適應症】狹心症；輕度至中度之本態性高血壓。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用。

1.狹心症：通常成人 1 次 30mg，1 日服用 3 次。症狀較重時，可增量至 1 次 60 mg，1 日服用 3 次。

2.輕度至中度之本態性高血壓：通常成人 1 次 30mg~60mg，1 日服用 3 次。又，依年齡、症狀適宜增減用量。(參考)〔日本藥局方第 11 版所載極量：Diltiazem HCL 1 次 90mg，1 日 360mg(口服)〕

【注意事項】

1.本藥由腎臟及膽汁排泄，故若長期使用或腎、肝功能不全之患者，使用本藥時應隨時監視之。

2.懷孕婦女：懷孕或可能懷孕婦女使用本藥之安全性尚未建立。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：C

3.哺乳婦女：哺乳婦女使用本藥之安全性尚未建立。

4.幼兒：幼兒使用本藥之安全性尚未建立。

5.使用上注意：

心傳導：本藥延長房室結之傳導，但除非病患有竇房結疾患，否則並不緩慢竇房結之跳搏。

心臟衰竭：本藥雖有降低心肌力，但對正常心室並無影響。臨床上若使用於心室受損患者，則避免使用，尤應避免與β-阻斷劑併用，本藥使用於此類病患時亦應避免劇烈運動。

低血壓：併用其他降血壓劑時應注意。

急性肝受損：此類作用少見。

6.本藥並不能阻止急性狹心症發作。

【相互作用】β-阻斷劑及毛地黃與本藥併用會相互增加作用。

【副作用】

1.時有水腫 (2.4%)、頭痛 (2.1%)、噁心 (1.9%)、眩暈 (1.5%)、發疹 (1.3%)、無力感 (1.2%)、房室阻斷 (1.1%)。

2.少有 (少於 1%)

心血管系統：顏面潮紅、心律不整、低血壓、心跳緩慢、心悸、心臟衰竭、暈厥。

神經系統：感覺異常、神經過敏、嗜睡、顫抖、失眠、幻覺、健忘。

胃腸系統：便秘、消化不良、腹瀉、嘔吐、鹼性磷酸鹽、SGOT、SGPT、LDH 等的中度提高。

皮膚：搔癢、紫斑、蕁麻疹、對光敏感。

其他：多尿、夜尿。

【儲存條件】

本藥應儲存於冷暗乾燥處，避免光熱照射。

【包裝】6~1000 錠瓶裝，盒裝。

賦形劑：

Lactose

Hydrogenated oil

PEG 4000

Ethyl cellulose 10 cps

Hydroxypropyl cellulose

Magnesium stearate



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號