

荷爾蒙補充劑

伊黛歐 膜衣錠1毫克

Ediol F.C. Tablets 1MG

【特性】

在停經婦女本品可作為補充或替代卵巢內生的動情激素。本品可減少婦女因動情激素缺乏所產生的症狀或使之完全消失，本品亦可防止停經後婦女之骨質流失(最小的有效劑量是1 mg Estradiol)。本品是一種動情激素製劑。在每個循環療程中，若加入十天的黃體激素，可保護子宮內膜，對大部份的病人可引起子宮內膜有規律的剝落。

【成份】

每一膜衣錠中含有
Estradiol1 mg.

【適應症】

雌性激素不足所引起之諸症狀和預防更年期婦女骨質流失。

【用法・用量】

每天口服一錠，持續使用無需間斷。

有月經的婦女或已開始荷爾蒙補充療法的婦女，第一錠應從月經出血第五天開始依指示服用。其他患者可於任何一天開始依指示服用。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

1. 已知，懷疑或曾患乳癌之患者。
2. 已知或懷疑動情激素依賴型腫瘤，如子宮內膜癌。
3. 急慢性肝病或曾患肝病，且其肝功能尚未恢復正常者。
4. 深部靜脈血栓、血栓性疾病、腦血管意外或先前使用動情激素，曾有這些病史者。
5. 不明病因所引起的生殖器不正常出血者。
6. 已知或懷疑懷孕者。
7. 吡咯紫質沉著病患者。

【警語】

單獨使用動情激素時，會有增加子宮內膜癌的危險。子宮內膜增生(非典型的或腺瘤型的)常發生在子宮內膜癌之前。最近的研究結果建議，在每個週期中至少使用10天足量的黃體激素，即可完全避免子宮內膜過度增生。長期使用高劑量動情激素補充療法，會增加乳癌的風險。而短期低劑量動情激素補充療法，並不會增加乳癌的風險；長期使用低劑量動情激素，目前並沒有足夠的研究，但是可能不會有實質上增加乳癌的風險。

【注意】

在開始任何動情激素療法前，應先做身體檢查及完整醫療及家族病史的調查。特別是關於像：血壓、乳房檢查，腹部及婦科檢查。現在或以前曾單獨使用動情激素治療的患者，在開始使用本品治療前，應先小心檢查子宮內膜是否有過度刺激的可能性。

通常動情激素不應在沒有其他身體檢查的情況下，包括婦科檢查，使用超過一年。

如果在治療期間或剛開始治療後，有不正常或不規則出血發生，可能需要作診斷性的活組織切片檢查或刮除術，以排除子宮腫瘤的可能性。長期預防性治療骨質疏鬆症，應限於發生骨折風險高的婦女使用。

容易罹患骨質疏鬆的因子：

1. 白人或亞洲人。
2. 女性。
3. 身材瘦小或嬌小者。
4. 家族有此病史者。
5. 停經前或後動情激素缺乏者。
6. 早停經者。
7. 鈣營養不足。
8. 抽煙者。
9. 酗酒者。
10. 有久坐的生活習慣。

使用抗高血壓藥治療之患者、癲癇、偏頭痛、糖尿病、氣喘或心臟衰竭的患者，應定期監測用藥情形。

曾有報告指出動情激素補充療法和血栓性疾病有關，但無證據顯示整體發生率會增高。

需立即停止治療的情況：

1. 深部靜脈栓塞。
 2. 血栓性疾病。
 3. 出現黃疸。
 4. 出現偏頭痛樣的頭痛。
 5. 突然的視覺模糊。
 6. 血壓明顯增加。
- 在大手術前4~6週最好停止服用本品。

本品不具有避孕效果。

【藥品相互作用】

動情激素會與肝酵素誘導藥物產生交互作用，增加動情激素的代謝，而降低動情激素的效果。已被證實會產生交互作用的肝酵素誘導藥物包括：Barbiturates，Phenytoin，Rifampicin，Carbamazepine。

【副作用】

本品主要的副作用為不規則出血，最常發生於治療的前幾個月，甚至，某些病人可能會從萎縮的子宮內膜出血，目前出血的原因仍未知。治療幾個月後，出血的頻率會逐漸降低。某些停經婦女出血可能持續。對這些患者可考慮選擇其它替代療法。若忘了服用錠劑，可能會導致出血。乳房觸痛、噁心、頭痛與水腫，這些症狀通常很短暫。此外，禿髮、皮膚過敏與視力不正常皆曾被報導過。雖然乳癌與血栓性疾病也被報導過。然而沒有理由相信其發生率會增加。

【貯藏】

貯存於陰涼乾燥的地方。避免冷藏，請置於小孩伸手不及處。

【賦形劑】

Lactose Monohydrate、Corn Starch、Povidone K-30、Talc、Corn Starch Dried、Magnesium Stearate、HPMC 615、PEG 400、Titanium Dioxide、FD&C Yellow No.6 Aluminum Lake

【包裝】

2-1000錠，鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 **G-7459** 號
044295

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉光復北路21巷4號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號

SLT9110H