

Epbuto! Epbuto! Epbuto! Ep

“優生” **易復癆錠** (醫肺妥)

Epbuto! Tablets "Y.S." (Ethambutol)

(許可證字號：衛署藥製字第019877號)

本品對於生長中之分枝桿菌屬微生物，包括結核桿菌在內，有特殊療效。因能滲入積極生長之分枝桿菌，例如結核桿菌之細胞內，抑制一種或一種以上代謝產物之合成，引起細胞之代謝障礙，抑制繁殖及使細胞死亡，本品對其他抗結核劑有抗藥性之結核菌之初治療具有療效，且與目前使用之其他抗結核菌劑之間未發現有交叉抗藥性存在。

【組 成】： Each tablet contains:

Ethambutol HCl 400mg

【適應症】：

結核病。

【用法·用量】：

初治療：1天1次，每次15mg/kg

再治療：1天1次，每次25mg/kg

本藥須由醫師處方使用

【警語和注意事項】：

(一) 糖尿病患者，酒精中毒患者勿使用。

(二) 腎機能障礙者恐有引起積蓄作用，使用需注意。

(三) 本品對於眼睛有獨特不良作用，體格檢查時必須包括眼睛檢查，手指視野測定檢查，及色盲檢查。

(四) 視毒性：Ethambutol可能會引起一種特殊且通常具可逆性之視力與辨色力障礙，該障礙可能是因視神經炎所致，與使用本藥品之劑量及治療時間相關，因此應注意病人在服藥期間之視力與辨色力。建議在病人開始治療前先進行視力檢查，治療期間宜每個月詢問病人是否有視力與辨色力障礙。當使用劑量超過15mg/kg時，應每個月作視力檢查。

【不良反應】：

肝膽疾病：服用包括ethambutol等多種藥品病患中曾有發生肝炎、黃疸、肝功能異常及非常罕見的肝衰竭等不良反應之案例。病人若出現肝失償之徵兆與症狀或於治療中出現不適，應進一步檢測肝功能。

【賦形劑】：

Dibasic Calcium Phosphate, Sodium Starch Glycolate (Primogel), Polyvinyl Pyrrolidone K30 (PVPK-30), Magnesium Stearate, Silicon Dioxide (AD-101)

【包裝】：

瓶裝：100's，200's，500's，1000's

盒裝：100's



優生製藥廠股份有限公司

台中市南屯區工業區21路14號

MM 201904