

抗生素製劑

“培力”
紅 黴 素 膠囊 250 毫克
ERYTHROMYCIN Ethylsuccinate Capsules 250mg "P.L."

本劑主成分Erythromycin Ethylsuccinate是口服紅黴素衍生物中藥效最高的一種，對於絕大多數細菌所引起的感染症均可奏效，尤適於治療對於青黴素有耐性的葡萄球菌所引起的感染症，並具有下列各優點：

1. 藥效高，乃因在胃酸中穩定，在腸內可完全被吸收。
2. 藥性持久。
3. 服用簡便，不必考慮用膳時間。

【成分】每一粒膠囊內含：Erythromycin (as ethylsuccinate) 250mg(力價)

【賦形劑】Magnesium Stearate

膠囊殼：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Brilliant Blue FCF, New Coccin, Titanium Dioxide, Tartrazine, Sunset Yellow FCF

【適應症】葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。本藥須由醫師處方使用。

【用法用量】成人：一次本劑1粒，一天4次內服。

小兒：一次以每公斤體重本劑10mg(力價)之劑量，一天4次內服。

【注意事項】

1. 慎重投與：有肝臟機能障害的患者。
2. 副作用：
 - a. 過敏症：患者有過敏症狀出現時應停藥。
 - b. 消化器：有些患者出現食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、鼓腸、胃部不快感、便秘、腹部痙攣。
 - c. 肝臟：有些患者會出現肝機能障害。
 - d. 菌交代症：長期連用後將出現菌交代症。
3. 妊婦的投藥：妊娠中投藥的安全性尚無確立，故對於妊婦及有可能妊娠的婦女，在治療上要對其危險性及有益性作適當的判斷，才可以投藥。
4. 相互作用：下列藥品併用時將使其作用增強，如有併用時應作適當的減量。
Ergotamine含有之製劑Carbamazepine，Cyclosporine，Digoxin，Theophylline Warfarin。
5. 其他：大量投藥後，有可逆性難聽出現的報告。

【儲存】25℃以下，於原包裝儲存。

【包裝】8-1000粒塑膠瓶裝。



培力藥品工業股份有限公司

地址：407台中市西屯區工業區六路11號

電話：04-23592576 (代表號)

傳真：04-23590992

ERP-D_04