

“信東”

艾斯樂 錠2公絲 (伊塔諾浪)

Eszo Tablets 2mg (Estazolam)

【成分】

每錠含Estazolam.....2mg

【臨床藥理】

本藥係屬Benzodiazepine系化合物所開發之Triazolo-1,4-benzodiazepine衍生物。本藥與Diazepam、Nitrazepam等Benzodiazepine類化合物具相同藥理作用（如鎮靜、抗焦慮、導眠、增強睡眠、抗痙攣及肌肉鬆弛等作用）。特別對於睡眠，作用強且安定。本藥之催眠機轉與Benzodiazepine類化合物相同，被認為是對大腦邊緣系及下視丘之情動機制及下視丘腦幹覺醒維持機制的抑制，並非直接作用於覺醒機制，因此不致於導致麻醉狀態。

本藥經口服投與後能迅速的經由胃腸道吸收，雖然目前尚無人體之生體可用率報告，惟以小老鼠試驗，其生體可用率可高達98%。至於食物對本藥在胃腸道之影響目前尚未確立。當投與本藥2mg後，0.5~1.6小時可達最高血中濃度。而劑量增為4mg時，約5小時可達最高血中濃度，半衰期則約為24小時。

本藥綜合其作用具以下特點：

- 1.屬於具有抗不安和鎮靜作用之Benzodiazepine系催眠劑。
- 2.效果出現快、催眠中途覺醒現象少，維持安定之睡眠。
- 3.對入睡障礙、熟眠障礙，早朝覺醒，投與少量則立可呈現催眠效果。
- 4.對神經性、精神性、器官性等種種原因所引起之失眠症有效。

【適應症】

失眠。

【用法・用量】

本藥須由醫師處方使用。

本藥之用量應就患者之病情、年齡、疾患之種類等酌情增減之。一般成人，請依下列指示投與：失眠症：就寢前一次口服1~2mg。

【注意事項】

1.一般需注意之處：服用本藥後，翌晨可能尚餘睡意，應避免從事汽車駕駛等危險的機械操作。

2.對孕婦、哺乳婦之投與：

(1)對妊娠中之投藥由於有下列之報告，因此其安全性尚未確立，除非經衡量結果，其治療之有利遠大於害處，否則不建議孕婦及可能懷孕婦人投與本藥。

(a)依實驗報告指出，妊娠中婦人投與本藥或其他Benzodiazepine系化合物，畸型兒等障礙兒較對照組為有意義之增加。

(b)其他Benzodiazepine系化合物(Diazepam, Nitrazepam)有引起新生兒哺乳困難、肌肉緊張低下、嗜眠、黃疸增強等症狀之報告。

(c)另外有報告指出，生產前持續服用另一種Benzodiazepine系化合物(Diazepam)有引起新生兒過敏、震顫、肌肉緊張等禁斷症狀出現。

(2)有報告指出另一種Benzodiazepine系化合物(Diazepam)可移行於母乳中有引起新生兒嗜眠、體重減輕、黃疸增強之可能性，故對哺乳婦應避免投與，不得已須投與時，應停止哺乳。

(3)FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：X

3.對小兒之投與：

本藥對乳兒、幼兒、小兒之安全性尚未確立。

4. 下列患者應慎重投與本藥：

- (1) 衰弱患者、高齡者（易引起副作用，儘可能以少量開始投與）。
- (2) 心、肝、腎障礙等患者。
- (3) 腦器質障礙患者。
- (4) 乳兒、幼兒、小兒。

5. 下列患者原則上勿投與本藥，若必要時請慎重投與：

肺性心、肺氣腫、支氣管氣喘及急性期腦血管障礙等呼吸機能極度低下時易引起二氧化碳中毒。

6. 禁忌症：

重症肌無力患者。

7. 長期使用本藥應定期檢查肝、腎機能及血液等。

8. 使用本藥品時併服葡萄柚或葡萄柚汁時，應注意可能產生的藥品相互作用。

9. 服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。

【相互作用】

因為與下列藥品併用或飲酒後會增強本藥之作用，故在此種情形下應慎重投與。例如：其他種類之催眠、鎮靜劑、Phenothiazine系衍生物等中樞神經抑制劑、抗憂鬱劑及MAO抑制劑。

【副作用】

1. 習慣性：連續使用偶會產生習慣性的傾向，若突然中止投與則偶會出現譫妄、痙攣等戒斷症狀出現。

2. 精神神經系：

(1) 對精神分裂症等之精神障礙患者投與本藥曾有反而導致刺激、興奮、錯亂等之奇異反應發生。

(2) 偶有嗜眠、精神恍惚、眩暈、步行失調、頭痛、頭重、不快感、情感增盛、發音障礙等症狀出現。

3. 肝臟：偶有GOT、GPT上昇現象。

4. 腎臟：偶有BUN上昇現象。

5. 呼吸系統：偶有呼吸抑制現象發生，對於呼吸機能極度低下之患者投與本藥時，有引起二氧化碳中毒的可能，類似此種現象發生時，為確保呼吸道之暢通，應做換氣等適切之處置。

6. 血液：偶有貧血、白血球減少等現象發生。

7. 循環系：偶有血壓低下，間有心悸之現象發生。

8. 消化器：偶有噁心、口渴現象、間有口苦感現象。

9. 過敏症：若有發生過敏症狀時應立即中止給藥。

10. 骨骼肌：偶有倦怠感、脫力感等肌肉緊張低下症狀發生。

11. 其他：

(1) 間有浮腫症狀出現。

(2) 麻醉前投與時，有覺醒遲延之傾向。

【保存條件】

本藥應儲存於15~30℃，緊密容器。

【包裝】

2~1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第042646號G-6483



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路22號

54050270⑨