

弗路欣錠

Flusine Tablets

衛署藥製字 第 048355 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-06-13

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠含500mg Flucytosine。

1.2 賦形劑

Dextrose Anhydrous、Croscarmellose Sodium、Magnesium Stearate。

1.3 劑型

錠劑。

1.4 藥品外觀

白色橢圓形錠劑，一面有一刻痕及TTY、FC字樣。

2 適應症

白色黴菌病、黴菌性肺炎及產色黴菌病。

3 用法及用量

3.1 用法用量

每天每公斤體重服100-200毫克，用藥期間視病情之輕重決定之。

3.2 調製方式

不適用。

3.3 特殊族群用法用量

目前尚無資訊。

4 禁忌

4.1 對此藥過敏者，不宜使用之。

4.2 已知dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)活性完全缺乏之病人。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 腎或肝功能不健全者，劑量必須降低。

5.1.2 Dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)缺乏症：Fluorouracil為flucytosine之代謝物。Dihydropyrimidine dehydrogenase(DPD)是主要參與fluorouracil降解之酵素。因此，當flucytosine用於DPD缺乏症患者會有較

高風險發生嚴重的fluorouracil毒性。若懷疑病人發生fluorouracil毒性時，需考慮停止使用flucytosine 治療。

5.2 藥物濫用及依賴性

目前尚無資訊。

5.3 操作機械能力

目前尚無資訊。

5.4 實驗室檢測

目前尚無資訊。

5.5 其他注意事項

在規定之劑量內服用，耐受性極佳。一天之總劑量在1-2公克之間通常無副作用。高劑量可能發生噁心、嘔吐等副作用。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

目前尚無資訊。

6.2 哺乳

目前尚無資訊。

6.3 有生育能力的女性與男性

目前尚無資訊。

6.4 小兒

目前尚無資訊。

6.5 老年人

目前尚無資訊。

6.6 肝功能不全

目前尚無資訊。

6.7 腎功能不全

目前尚無資訊。

6.8 其他族群

目前尚無資訊。

7 交互作用

7.1 Brivudine及其類似物(sorivudine)

曾有報導brivudine及其類似物sorivudine和fluorouracil 間有臨床上具意義的藥物交互作用，是導因於sorivudine 及brivudine 會抑制dihydropyrimidine dehydrogenase 的活性。此交互作用導致fluoropyrimidine 的毒性增加而具潛在致命性，因此，本藥品不可與sorivudine 及brivudine 併用。在結束使用sorivudine 及

brivudine 和開始使用本藥品治療間，必須至少要有4 星期的等待期。在使用完本藥品最後一劑後24 小時可以開始sorivudine 及brivudine。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

8.3 上市後經驗

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

口服吸收完全，且全部經腎臟排出，其結構並無改變。

12 臨床試驗資料

Flucytosine做體內及體外之試驗，證實對各種黴菌有效。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4~1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

13.2 效期

請見藥品外包裝及瓶身標示。

13.3 儲存條件

請儲存於25°C以下

13.4 儲存注意事項

目前尚無資訊。

14 病人使用須知

目前尚無資訊。

15 其他

本文修訂日期

2022年4月

製造廠

臺灣東洋藥品工業股份有限公司六
堵廠 基隆市七堵區工建西路5號

藥商

臺灣東洋藥品工業股份有限公司 台北市南港區園區街3之1號3樓