

富利瀉 內服液

Fulisay Oral Solution 45 mL/Bottle

檢查前注意事項：

1. 檢查前二日可食用低渣飲食（如：稀飯、白麵條、白吐司…等），可喝運動飲料。不宜吃任何高纖、高蛋白食物、奶製品類（如青菜、水果、豆腐、麵筋…等）。
2. 檢查前一天，三餐請吃清麵食或清湯，嚴禁牛奶等奶類食物，晚餐請於下午5點前進餐完畢。

服用方法及時間

☆服用方法

1. 每次服用前將45c.c. “富利瀉內服液” 加入約360c.c. 冷飲（如：沙士、蜜茶等）或水中。
2. 稀釋後在**半小時內慢慢喝下**。
3. 開始排便後，請**陸續分多次補充冷飲**或水份，至少1000c.c.。

☆服用時間

☐ 早上檢查者

第一劑：檢查前一天晚上4~6點。

第二劑：檢查當天上午4~6點。

* 兩劑間隔約12小時清腸效果較佳。

第二劑需於檢查前6小時服用完畢。

☐ 下午檢查者

第一劑：檢查前一天晚上4~6點。

第二劑：檢查當天上午7~8點。

* 兩劑間隔約12小時清腸效果較佳。

第二劑需於檢查前6小時服用完畢。

其他注意事項

1. 服藥後大約30~60分鐘左右開始作用，作用將持續4~6小時。若在服用2小時後無排便現象，應停止服藥，直到排便開始再繼續服用。
2. “富利瀉”服用完至檢查前，如有口渴、饑餓、頭暈等低血糖現象，可飲用運動飲料或糖水等。
3. 洗腎、先天巨結腸症、腸阻塞、鬱血性心衰竭、腹水之病患請勿使用。

檢查前的飲食建議

◎ 建議飲食 (檢查前三日開始建議飲食)



稀飯



饅頭



豆腐乳



麵線



白吐司



海綿蛋糕



去皮魚肉



蒸蛋 (無加料)

◎ 不宜飲食 (檢查前三日開始不宜飲食)



牛奶、奶製品



起司、乳酪



豆漿



蔬菜、水果

◎ 無渣流質飲食 (開始服用瀉藥後的飲食)



無渣飲料



運動飲料



清湯 (無加料)

☆由於每個人體質不同，即使完全遵照建議的指示，且嚴格控制飲食，但仍有少數受檢者無法清腸完全。

請務必配合以上飲食注意事項