

富利瀉口服液

Fulisay Oral Solution

適應症：緩解偶發性便秘，手術前、X 光或內視鏡檢查前之腸灌洗。

主要成分：

主要成分 (每 mL 含)	用途
Monobasic Sodium Phosphate, Monohydrate 480mg	鹽類緩瀉劑/腸灌洗
Dibasic Sodium Phosphate, Heptahydrate 180mg	鹽類緩瀉劑/腸灌洗

*每茶匙(5mL)含鈉556mg，相當於每mL含鈉111.2mg。

賦形劑：Citric acid monohydrate, Glycerin, Sucralose, Sodium Benzoate, Purified Water.

作用理論：鹽類緩瀉劑能增加水分滯留於小腸，因而促進排便功能。

使用方法：

1. 醫療程序前清腸

- 依醫師指示使用本產品作為清腸劑前，請確定醫師了解您的身體狀況及本產品的警語。服用劑量請以醫師建議劑量為主，並額外多補充清流液體以補充因瀉下所流失的水分 — 最少240 mL。
- 服用劑量：每次清腸使用二次30mL或45mL富利瀉口服液，兩次劑量服用間隔10～12小時。
- 每次服用方式：

年齡 (歲)	步驟 1	步驟 2
成人、12 歲以上	30-45mL 藥液加入一杯約 240mL 冷飲或水中，喝下。	至少再喝 3 杯約 720mL 冷飲或水
10 & 11 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5～9 歲	詢問您的醫師	詢問您的醫師
5 歲以下	不可使用	不可使用

2. 緩瀉劑：

- 當作緩瀉劑緩解偶發性便秘，劑量及使用方式如下表：
- 除非醫師建議，請勿使用過量（見警語）。每次服用不可超過45 mL且儘可能多喝水以補充因瀉下所流失的水分。
- 服用量及方式（便秘患者）：

年齡 (歲)	步驟 1	步驟 2	24 小時最大劑量
成人、12 歲以上	15mL 藥液加入一杯約 240mL 冷飲或水中，喝下。	至少再喝一杯約 240mL 冷飲或水	45mL
10 & 11 歲	15mL 藥液加入一杯約 240mL 冷飲或水中，喝下。	至少再喝一杯約 240mL 冷飲或水	15mL
5～9 歲	7.5mL 藥液加入一杯約 240mL 冷飲或水中，喝下。	至少再喝一杯約 240mL 冷飲或水	7.5mL
5 歲以下	不可使用	不可使用	不可使用

警語

- 24小時內之服用劑量若超過建議劑量，可能引起傷害。
- 請勿使用於鬱血性心臟衰竭、腎臟疾病或5歲以下小孩。
- 懷孕、授乳、限鈉飲食或有任何醫療狀況者，請詢問過醫師後再使用。
- 若您正服用處方或非處方藥品，請先詢問過醫師或藥師後再使用。
- 若您有腹痛、噁心、嘔吐、排便習慣改變持續2個禮拜、已經服用其他瀉劑治療便秘超過1禮拜，請先詢問過醫師後再使用。
- 若您直腸出血、服藥後6小時腸未蠕動或出現脫水現象時，請停止使用並詢問您的醫師。早期脫水症狀包括嘔吐、眩暈或尿量比平常少，這些症狀也許是嚴重問題的徵兆（此時請大量補充水份）。
- 請存放在孩童不易取拿之處。如果過量或意外服用，必須立刻求助醫護協助。

不良反應

- 電解質失衡、急性磷酸鹽腎病(Acute phosphate nephropathy)、紅疹及搔癢...等不良反應。

其他資訊

- 一茶匙(5mL)含：鈉556mg，本產品不含任何糖份。
- 一般在服用後30分鐘至6小時會產生排便(視服用劑量不同而不同)。
- 放入冰箱冷藏可增加口感，但不可冷凍。

為安全起見，本品瓶口處均密封包裝，若封口鋁箔破損或不見，請勿使用。

儲存條件：儲存於25℃以下

有效期限：請見標籤(或彩盒)標示

包裝種類：100mL以下塑膠瓶裝。

類別：本藥須由醫師處方使用。

衛署藥製字第 GMP G-11109 號。
055294

【製 造 廠】



中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.
廠 址：251新北市淡水區埤島里行忠路120號
服務專線：(0 2) 8 6 3 1 - 0 0 1 8