

腸見淨粉劑

GI Klean Powder

衛署藥製字第 057180 號

主成份：每包含	Polyethylene Glycol 3350	59.0000 g
	Sodium Sulfate Anhydrous	5.6850 g
	Sodium Bicarbonate	1.6850 g
	Sodium Chloride	1.4650 g
	Potassium Chloride	0.7425 g

賦形劑(水果口味)：citric acid、sucralose+AK、cranberry flavor powder、cranberry powder

適應症：腸道檢查、手術前淨腸。

用法用量：每包須以一公升水配置成溶液，口服給予。

建議用藥前 2 小時不要進食物，直到相關檢查或手術結束。

成人（包括老人）應遵照醫師指示，選擇以下任一方式服用：

檢查或手術前一天傍晚一次服用

每包須以一公升水配置成溶液，每 10 至 15 分鐘喝 250 毫升，至排出液澄清或服用 4 包量為止，但需在 4 至 6 小時內服用完畢。

分為兩次服用

每包各以一公升水配置成溶液，2 包（配置的溶液 2 公升）於檢查或手術前一天傍晚服用；剩餘 2 包（配置的溶液 2 公升）於檢查或手術當天早晨服用。建議最後一杯溶液至少在進行檢查前一小時喝完，以確保全排淨。

若以鼻胃管投予者，其速率為每分鐘 20 至 30 毫升。

腎功能不全之病人無須更改劑量。

兒童：不建議使用。

類別：本藥須由醫師處方使用。

配伍禁忌：1. 對本藥品之主成份或賦形劑過敏者。

2. 充血性心臟衰竭(NYHA grades 3 and 4)。

3. 嚴重腎臟功能不全。

4. 已知或疑似胃腸道阻塞、穿孔、腸塞、胃滯留、急性胃腸潰瘍、毒性結腸炎、巨結腸。

5. 體重低於 20 公斤者。

警告：1. 對失去知覺或半清醒的病人或俯臥式呼吸者或會反胃的病人應特別注意，使用鼻胃管的病人亦須要特別注意。

2. 開始使用本藥品之前應對潛在腎功能不全的病人(例如急性心肌梗塞或不穩定性心絞痛，老年人或疲勞過度的病人)執行利益-風險評估。

3. 本藥品使用於活躍性腸道炎症者應特別小心。

4. 雖然與本等滲透壓產品並無關係，對非常少數產生電解質混亂的潛在風險患者在使用本藥品時應特別注意電解質變化的狀況(例如腎衰竭的病人、心臟衰竭或同時服用利尿劑的病人)。

這些病人於治療時應維持適當的水合狀態(hydration)。使用前及治療後應注意電解質的變化。

5. 如感覺腹脹或疼痛，本藥品之投與速度應減緩。

6. 對孕婦亦需考慮是否使用之，使用時應特別注意。

交互作用：所有口服藥物均須於服藥前至少 1 小時使用。

懷孕及授乳：無懷孕時期使用之相關數據。對孕婦亦需考慮是否使用之，使用時應特別注意。

副作用：腹痛、腹脹。噁心、嘔吐、肛門刺激感過敏反應如出疹，蕁麻疹及水腫。

注意事項：配製成的溶液應冷藏(2-8℃)且須於 24 小時內使用完畢。剩餘或不用之溶液須丟棄。

包裝：4-13 包鋁箔袋盒裝。(每包 72g~73g)

貯存：25℃ 以下，乾燥貯存。

藥商：虹錡生技有限公司

藥商地址：臺中市北區建興里北興街 296 巷 5 號 3 樓之 3

製造廠：衛達化學製藥股份有限公司

製造廠地址：臺中市工業區 23 路 21 號