

"吳羽"克裏美淨速崩錠500毫克

Kremezin Tablets

衛部藥輸字 第 028080 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

版次 2

【性狀】

KREMEZIN 藥品物質是經由在高溫下氧化還原球型活性碳而得到之球狀具吸附力之碳，原料活性碳則是衍生自石油的碳氫化合物。

1 成分

1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：每包 4 錠(2 公克)，每錠含 500 毫克 Spherical Absorptive Carbon (活性碳)。

1.2 其他成分(賦形劑)

Pullulan, Sodium lauryl sulfate。

2 用途(適應症)

吸附干擾胃腸道的細菌性毒素、消化性毒素及其他有機性廢物有關症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 必須使用口服特殊之解毒劑的人。
- 3.1.2 有消化道輸送失調 (transit disorder) 的人。
- 3.1.3 腐蝕性物質引起之中毒的人。
- 3.1.4 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.5 當合併使用其他口服藥物，在考量本產品為吸附劑的情況下，不應同時使用。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 消化性潰瘍或食道靜脈曲張的人，因本藥可能會造成局部刺激 (本產品是以固態狀態下經過消化道，可能會刺激經過區域)。
- 3.2.2 便秘的人。
- 3.2.3 肝臟疾病的人。
- 3.2.4 正在服用避孕藥的人。
- 3.2.5 不確定中毒原因的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 3.3.1 正在服用其他藥品的人，特別是治療高血壓用藥、治療類風濕關節炎藥品等。

3.3.2 對於有些中毒情況，可能需要併用其他類別的解毒劑，應經過醫師診治使用。

3.3.3 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 服用本藥品可能會造成黑便，並加重便秘的情況。

3.4.2 潛在肝病患者服用本藥品可能使血液中的氨濃度升高。

3.4.3 服用後如無緩解或改善請洽醫師診治。

4 用法用量

用法	本劑型少量的水即可崩解，請放入口中以水讓其崩解後吞服。
用量	每次一包，一天三次，兩餐間服用。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、腹瀉

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 若經醫師、藥師、藥劑生指示使用後，症狀沒有改善。

6 包裝

4 錠/鋁箔包裝，3 ~250 包紙盒裝

7 儲存方式

25°C以下

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

SATO YAKUHIN KOGYO CO., LTD. 9-2, KANNONJI-CHO, KASHIHARA, NARA, JAPAN

藥商

杏昌醫藥科技股份有限公司 台北市松山區民生東路三段107巷6號2樓