

胺舒靈®懸浮液

Licure suspension

衛部藥輸字027063號

【描述】

白色到淺黃的懸浮液，草莓口味。

【成分】

有效成分及含量：

每包20g含有L-Isoleucine 0.952g，L-Leucine 1.904g，L-Valine 1.144g
其他成分(賦形劑)：Microcrystalline Cellulose、Carboxymethylcellulose Sodium, Hydroxypropylcellulose, Povidone, Sucralose, Acesulfame Potassium, D-Sorbitol Solution, Sodium Chloride, Citric Acid Hydrate, Dibasic Sodium Phosphate, Methylparaben, Propylparaben, Simethicone, Strawberry Flavor.

【用途(適應症)】

支鏈胺基酸之營養補給。

【使用上注意事項】

有下列情形者，請勿使用：

1. 有先天性代謝缺陷的人不可使用，特別是支鏈胺基酸代謝異常，例如楓糖尿症、異戊酸血症等。

有下列情形者，請洽醫師診治：

1. 兒童：兒童的安全劑量未建立(無兒童使用經驗)

有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 65歲以上。

2. 孕婦和可能懷孕和哺乳女性。

其他使用上注意事項：

1. 懷孕和哺乳劑量的安全性未建立，孕婦和可能懷孕和哺乳女性只有益處超過風險下，才服用此藥。

2. 儲存注意事項

1) 請將此藥品放在兒童不能接觸的地方。

2) 為避免影響藥物效果及誤食，不要儲存在其他容器中。

3. Licure懸浮液僅含支鏈胺基酸，因此不能充分地提供所有的必需胺基酸。因此服藥時，應隨餐併服必需的蛋白質(胺基酸量)和熱量(超過40克每天的蛋白質，每天超過1,000kcal)。特別是，當此藥用在蛋白限制飲食之病人，藥物效果不被期待或是每日攝入量蛋白質和必要熱量的最小量不被維持；長期服藥下可能會導致的營養狀況惡化。

4. 如果觀察到異常BUN或血清氨是由藥物引起，請注意有服藥過量的可能性。此外，過量服藥從長期下來可能會造成營養狀況的惡化。

5. 不宜長期使用

6. 本品僅含支鏈胺基酸，無法補充所有必需胺基酸，建議仍須配合日常飲食或合併其他營養補給藥品使用。

【用法用量】

一天一次、一次一包(20g)。

【警語】

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
消化系統	便秘、腹瀉、腹脹不適、嘔吐、食慾不好、胃灼熱、口渴、打嗝
皮膚	皮疹、搔癢
其他	厭倦、水腫(臉部、下肢等)、發紅、潮熱

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

身體部位	副作用
代謝	代謝障礙(例如：血氨增加)
腎臟	腎功能損害
肝臟	肝功能損害

【包裝】14包(每包20公克)鋁箔袋盒裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存條件】在25°C以下儲存。



製造廠

Daewon Daewon Pharm. Co., Ltd.

24, Jayakgongdan, 1-gil, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

藥商

韋淳貿易股份有限公司

台北市松江路65號4樓, 02-25006378