

利控鉀口服懸液用粉劑 調製方式

LOKELMA Powder for Oral Suspension

利控鉀是什麼？

“利控鉀口服懸液用粉劑”為一種白色至灰色的結晶性不溶性粉末。適用於治療成人病人之高血鉀症。

調製方式

- ① 將小袋中的內容物全部倒入盛有約 45 毫升水的水杯中。
- ② 攪拌均勻，在不溶性粉末仍在懸浮狀態時飲用。
- ③ 懸浮液沒有味道，呈渾濁液體。如果粉末沉澱了，應再次攪拌均勻。確保服用全部的藥品。

注意事項

“利控鉀口服懸液用粉劑”可以空腹服用，也可與食物併服。

一般情況下，其他口服藥品應在“利控鉀”給藥至少 2 小時之前或 2 小時之後服用。

下面列出應在 LOKELMA 給藥之前 2 小時或之後 2 小時服用的藥物，以避免可能的胃 pH 值升高之藥物交互作用：

藥物類別	藥物
Azole 類抗黴菌劑	Ketoconazole、Itraconazole、Posaconazole
抗 HIV 藥物	Atazanavir、Nelfinavir、Indinavir、Ritonavir、Saquinavir、Raltegravir、Ledipasvir、Rilpivirine
酪氨酸激酶抑制劑	Erlotinib、Dasatinib、Nilotinib

LOKELMA 可與生體可用率不具 pH 依賴性的口服藥併服，無需間隔給藥時間。

本用藥指導單張無法取代專業醫療判斷，僅供專業醫護人員衛教病人使用，如有疾病或藥物使用的相關問題，請諮詢您的醫療專業人員。