

"利達"

脈立旺錠 10 毫克

Marion Tablets 10mg "LITA"

【劑型、含量】錠劑、每粒含：

主成分：Nicergoline.....10mg

賦形劑：Corn Starch、Sodium Starch Glycolate、Pregelatinized Starch、

Mannitol、Cyclodextrin-Beta、Magnesium Stearate

【臨床藥理】

迅速改善末梢血管循環障礙，具有 α -Adrenolytic 作用，可適當擴張血管，增加血流量，改善血管彈性。

【適應症】

末梢血管循環障礙。

【用法用量】

每次 5~10mg，一天 3 次在固定的間隔時段投與，為改善吸收，藥物應於餐間投與。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 於急性出血或嚴重心跳徐緩或使用抗高血壓劑、抗凝血劑、血小板抑制劑之病人，應小心使用。

2. 孕婦或可能懷孕婦女最好不要使用。

【禁忌】

1. 低血壓患者。

2. 對本品過敏者。

3. 頭部內出血。

【副作用】

少有副作用報告。如：服用後低血壓、眩暈、輕微胃部失調、熱潮紅、嗜眠、失眠。

【儲存】25℃ 以下避光儲存。

【包裝】3~1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 031282 號



利達製藥股份有限公司

LITA PHARMACY CO., LTD.

台中市大甲區中山路一段 906 號 消費者服務專線 04-26872345

