

“強生”美克利靜錠 25 毫克

MECLIZINE HCL TABLETS 25MG "JOHNSON"

內衛藥製字 第 012916 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each tablet contains :

有效成分及含量 : Meclizine Hydrochloride 25mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Alcohol 95%、Avicel 101、Densil、Magnesium Stearate、Povidone K-30、Sodium Starch Glycolate (Primojel)、Starch、Water Purified

2 用途(適應症)

預防或緩解動暈症 (暈車、暈船、暈機) 引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 12歲以下。

3.2.2 嚴重代謝性腎疾病的人。

3.2.3 曾診斷有下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病。

3.2.4 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難；及青光眼的人，因前列腺腫大引起排尿困難的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦。

3.3.2 65歲以上。

3.3.3 接受醫師治療並服用藥物的人。

3.3.4 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

3.3.5 服用其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥或抗過敏藥的人。

3.3.6 服用本藥若有不了解之處。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不得與酒精性飲料併用。

3.4.5 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

4 用法用量

成人及12歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前30-60分鐘前服用，1次2錠，一天服用一次。
12歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
神經系統	思睡、倦怠感、興奮。
皮膚	發疹、發紅、癢疹。
其他	頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之困擾。

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

1,000錠以下 塑膠瓶裝。

7 儲存方式

本藥應儲存於25°C以下緊密容器，避光貯存。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

強生化學製藥廠股份有限公司

新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓

藥商

強生化學製藥廠股份有限公司

新北市三重區三和路四段77號2、3樓、79號1至6樓