

W:120mm X H:180mm

色號：紅186u

黑black u

120 mm

120 mm

⑥

2025年3月

衛署藥製字第 021758 號

鎮咳祛痰劑
滅咳康複合膠囊
MEDICON-A CAPSULES

【成分與效用】

滅咳康複合膠囊係白色膠囊劑，每 1 膠囊所含成分如下表：

成 分	含 量	各 成 分 之 作 用
Dextromethorphan HBr	20mg	鎮咳。
Potassium cresolsulfonate	90mg	稀釋氣管之黏稠痰，使祛痰容易。
Lysozyme chloride	20mg (力價)	分解黏稠痰，使祛痰容易。

賦形劑包含：Lactose #100、Magnesium Stearate、Talc、Sodium Carboxymethyl Starch、Hydrated Silicon Dioxide (#67)。

膠囊殼成分：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Purified Water

【適應症】

鎮咳、祛痰。

【用法及用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人(15歲以上)1次1膠囊，1日服用3次。

【使用注意事項】

1.有下述情況者，服用前請與醫師或藥師商量：

(1)本人或父母兄弟等有易引起蕁麻疹、斑疹、過敏性鼻炎、偏頭痛、食物過敏等體質者。

180 mm

180 mm

Front

(2)曾發生藥物過敏症狀(例如發燒、發疹、關節痛、搔癢等)者。
(3)有宿疾、體弱或發高燒者。
(4)孕婦或疑似懷孕之婦人。
(5)正接受醫師治療者。

2.服用之際，請注意下列各點：

(1)本劑因含有相當於劇藥之成分，請嚴格遵守規定之用法用量。
(2)為避免重複服用之故，請勿與下列藥劑同時服用：
其他鎮咳祛痰藥、鎮靜藥等。

(3)本劑如與感冒藥同時服用時，請與醫師或藥師商量。

3.服用中或服用後，請注意下列各點：

(1)由於服用本劑而出現發疹、發赤、噁心、嘔吐、食慾不振、眩暈等症狀時，請停止服用，與醫師或藥師商量。
(2)服用本劑，有嗜睡之情形，請勿駕駛車輛或操作機械。
(3)如服用數次而症狀仍未見改善，請停止服用，與醫師或藥師商量。

4.管理上之注意點：

(1)請保存於兒童不易取得處。
(2)請保存於陰涼及較乾燥處所。
(3)請勿變換容器，避免誤服，兼可保持品質。

【包裝】

6~1000顆 PTP鋁箔盒裝、PE塑膠瓶裝。

【儲存方式】

請儲存於30°C以下

委 託 者：台灣塩野義製藥股份有限公司
台北市中山區松江路106號4樓B戶
電話：(02)25516336(代表號)

製 造 廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠
基隆市七堵區工建西路 5 號
電話：(02)24512466(代表號)



SHIONOGI

2IS02D010(A06)

Back