

紙張尺寸：10X22公分

“景德”

敏羅黴素 膠囊100公絲(美諾四環素)
MERO Capsules 100mg(Minocycline)
"Kingdom"

【主成分名(中文名)】

Minocycline(美諾四環素)

【劑型、含量】

膠囊劑：每膠囊含Minocycline(as hydrochloride)(100mg)(力價)

【藥理作用】

本品乃為抑制細菌蛋白質合成的抑菌性抗生素。

【適應症】

具感受性革蘭氏陰性及陽性菌，立克次氏體，巨型濾過性病毒所引起之感染症。

【用法用量】

1.常用劑量：

成人：開始時200mg，然後每12小時100mg。

8歲以上小孩：開始時4mg/kg，然後每12小時2mg/kg。

2.非併發之淋病感染(不包含尿道炎和直腸肛門感染)：

開始時200mg，然後每12小時100mg，至少持續4天，並於治療後2-3天內要做培養檢驗。

3.非併發淋病之男性尿道感染：

每12小時100mg，持續5天。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌】

1.對四環素過敏之患者，禁用本品。

2.孕婦、嬰兒和孩童應避免使用本品，因四環素類製品具胎兒毒害，且會造成發育期牙齒的永久變色(變成黃棕色)。

【注意事項】

1.本品會減緩口服避孕藥的效果。

2.本品會抑制血漿凝血酵素(Prothrombin)活性。故與抗凝血劑合併治療時，應降低調整抗凝血劑劑量。

3.本品屬制菌性藥物，應避免與殺菌性藥品如Penicillin合用。

4.本品的吸收會受制酸劑等包括鋁、鈣、鎂、鐵等成份之干擾破壞。

5.本品會由乳汁泌出，故哺乳婦女是否得用本品，應視此藥對哺乳婦女的重要性而權衡。

【副作用】

曾經發現的臨床副作用有：胃腸不適現象的發生，皮膚的光過敏反應，與劑量相關的腎毒害(BUN增高)，過敏反應，血液毒害。

【賦形劑】

Lactose、Magnesium Stearate

【膠囊殼成分】

Gelatin、Purified Water、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Erythrosine、Titanium Dioxide、Tartrazine、Sunset Yellow FCF.

【貯存】

請保存於乾燥陰涼處(15℃～30℃)。

【包裝】

4-1000粒塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

衛署藥製字第036940號G-3852

委託者：景德製藥股份有限公司

台北市中山北路二段113號8樓

製造廠：榮民製藥股份有限公司

桃園市中壢區中山東路三段447號

40417120 ②