

"培力" 邁妥林錠

MIDORINE TABLETS "P.L."

衛署藥製字 第 045334 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-06-01

版次 2

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每顆含有Midodrine Hydrochloride 2.5 mg

1.2 賦形劑

Microcrystalline Cellulose (M102D), Pregelatinized Starch, Colloid Silicon Dioxide (Adslider102), Magnesium Stearate, Talc

1.3 劑型

錠劑

1.4 藥品外觀

白色圓形錠，一面有PL/T03字樣

2 適應症

體質性血壓過低、直立性循環系統失調、病後、手術後及產後之血壓過低。

3 用法及用量

3.1 用法用量

除非有其他特別處方，請嚴格照著建議劑量使用。本藥須由醫師處方使用。

循環失調:成年及青年(12歲以上): 每次一錠，一天2錠(早、晚各一錠)

特殊病例可能須改為每次一錠，一天3次。

某些病例可每次1/2錠，一天2次。

正在服用鎮定劑或催眠劑的病人，使用本品之起始劑量應為一次1錠，一天2次，若需要，劑量可增至一次2錠，一天2-3錠。

兒童:由醫師案體重決定使用劑量。

尿失禁:成人:一次1-2錠，一天2-3錠。

3.2 調製方式

無

4 禁忌

下列患者不可投與本品: 高血壓，腎上腺髓質瘤(嗜鉻性細胞瘤)，急性腎炎，嚴重腎功能不足，青光眼，已形成尿殘留之攝護腺肥大，排尿機械性阻塞，甲狀腺機能亢進症。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

長期使用本品治療需檢查腎功能。與其他對血壓或心跳速率有作用的藥物合用需有醫師明確指示，且須經常監控血壓和心跳速率。

若有上述禁忌等存在發生副作用，請告知醫師。正懷孕或治療期間打算懷孕之婦女也請告知醫師。放置在兒童拿不到的地方。

6 特殊族群注意事項

目前尚無資訊

7 交互作用

本品之作用可被 α -阻斷劑如Prazosin、Phentolamine或Reserpine降低或中和。與強心配醣體(毛地黃製劑)共同使用會加強本品使心率減少之作用，在某些病例中會導致心律不整。與Atropine或Cortisone製劑共用會加強本品之升壓效果。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

可能會在某些個別病例中發生心律不整，心臟痛和皮膚上的反應(紅疹)。

9 過量

目前尚無資訊

10 藥理特性

本品藉著增加已鬆弛血管的張力和預防血液大量滯留於下肢靜脈來升高血壓。此種血液滯留常導致腦血流供給不足而產生頭昏眼花及循環虛脫。

10.1 作用機轉

目前尚無資訊

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4~1000錠HDPE塑膠瓶裝

4~1000

錠Al-Al鋁箔盒裝

13.2 效期

請見外包裝

13.3 儲存條件

不可放置在溫度高於25°C處!需避光儲存。

14 病人使用須知

將藥物連外盒一起儲存。有任何疑問請向你的醫師或醫療院所諮詢。

15 其他

15.1 耐藥性

無已知之耐藥性。

製造廠

培力藥品工業股份有限公司	台中市西屯區工業區六路11號
--------------	----------------

藥商

培力藥品工業股份有限公司	台中市西屯區工業區六路11號
--------------	----------------