

妙化肝 膜衣錠

Miyaphargen Film Coated Tablets

Glycyrrhizin

依賴其優秀之解毒作用，保護肝臟，改善肝臟機能，網內系細胞賦活，調解副腎皮質荷爾蒙之分泌，維持Corticoid之生體內活性，抗炎症作用，抗過敏作用，及水分、電解質代謝調整作用。又副腎皮質機能活性化，可防止使用Steroid Hormone(固醇類荷爾蒙)製劑所產生之副腎皮質之萎縮，因可對抗而解離Steroid Hormone之抗肉芽作用而抑制其抗肉芽作用。有脫除Cholesterol之作用，能抑制血中Cholesterol值之上升，阻止大動脈之粥狀硬化。

DL-Methionine

為必須氨基酸含硫氨基酸之一種，有解毒作用與抗脂肪肝之作用，有保護肝臟促進機能之改善。

Glycine

有抗過敏作用與解毒作用，並有胃酸度之緩衝調節作用及促進利尿作用。

【效果】

本錠含有以上之成分，由於相輔相乘之效果，故可發揮如下諸領域之療效。

1. 肝臟機能保護改善
對過敏及毒物、毒素之毒作用所引起之肝臟機能障礙，有保護及改善作用。
2. 消化器疾患之治療
可消除潰瘍發生之因素，治療胃潰瘍、十二指腸潰瘍有效。由於緩衝制酸作用，可迅速中和過多胃酸，保持長時間之正常胃泌。
3. 皮膚疾患之內服治療法
可抑制皮膚疾患之過敏機轉，治療效果發揮迅速。

【成分】

主成分：每膜衣錠含：

Glycyrrhizin	25mg
(as Glycyrrhizinate Monoammonium	25.5mg)
Glycine	25mg
DL-Methionine	25mg

賦形劑：Powdered Cellulose、Croscarmellose Sodium、Kollidon Va64、Microcrystalline Cellulose、Sodium Lauryl Sulfate、HPMC 606、Polyethylene Glycol、Titanium Dioxide。

【適應症】

肝炎、肝臟障礙、胃炎、胃酸過多症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、濕疹、皮膚炎、蕁麻疹、圓形脫毛症、鼻炎、支氣管痙攣。

【用法・用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人一日3次，每次2~3錠，小孩是成人半量，於飯後服用。

【注意事項】

1. 以下患者禁止使用
 - (1) Aldosteronism症患者
 - (2) Myopathy症患者
 - (3) 低血鉀症患者
2. 電解質代謝：
偶而有低血鉀症，血壓上昇， Na^+ 及體液滯留浮腫，體重增加等症之出現時，應作血中 K^+ 值測定，並停止用藥。
3. 神經肌肉：
低血鉀症偶而會造成Myopathy症，如有脫力感、四肢痙攣、麻痺等現象時，應停止用藥。
4. 相互作用
與Furosemide、Etacrynic Acid、Thiazide系利尿劑併用時，會有低血鉀症，應慎重投與。

【保存條件】

請儲存於25℃以下。

須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

12~1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第050037號

總代理 裕心企業有限公司
高雄市苓雅區青年一路1-3號
服務專線：07-7211010

製造廠 信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號

54011180②