



"應元"蓖麻子油

OLEUM RICINI "Y.Y."

內衛藥製字 第 005081 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-08-14

1 成分

1.1 有效成分及含量

每ml中含有：

Oleum Ricini.....0.96g

1.2 其他成分(賦形劑)

無。

2 用途(適應症)

軟便、緩解便秘。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- (1)曾因本藥成分引起過敏的人。
- (2)胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。
- (3)阻塞性腸炎、闌尾炎、腹膜炎。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- (1)12歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- (1)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳。
- (2)連續使用一星期以上。
- (3)併用其他瀉劑。

3.4 其他使用上注意事項

- (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2)避免陽光直射。
- (3)勿超過建議使用量。
- (4)本藥不應長期使用,一旦排便正常,即應停藥。應儘量以含纖維飲食,充分攝取水分及運動來改善便秘。
- (5)本藥使用期間可能會有腹瀉發生。
- (6)長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。
- (7)刺激型瀉劑無法抑制卡路里吸收,因此不能幫助減重。此類藥品會導致水瀉、腹痛與脫水,並因脫水造成短期體重下降。嚴重脫水可能會造成顫抖、無力、視覺模糊、暈厥、腎損傷,甚至死亡,往往需要藥物治療。



(8)過度使用刺激型瀉劑可能會導致電解質不平衡。體內鈉、鉀、鎂、磷為維持神經肌肉所需之特定電解質,破壞此平衡可能會造成大腸及心臟功能異常。為避免上述風險,需避免過度或不正確的使用瀉劑。

(9)本藥避免與 Droperidol、Levomethadol、Licorice 併用。

(10)若於睡前使用,應預留排便時間。

4 用法用量

年齡	劑量	
成人(15歲以上)	一次20ml	不分年齡,皆以一日一次為限,建議空腹使用,搭配足量開水。若覺口感不佳,可併服果汁或碳酸飲料。
12歲以上~15歲以下	一次13ml	
12歲以下	請洽醫師診治	

5 警語

5.1 服用本藥後,若有發生以下副作用,請立即停止使用,並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	發疹等過敏症狀。

5.2 服用本藥後,若有發生以下症狀時,請立即停止使用,並接受醫師診治

- (1)若有任何不適情況產生。
- (2)腹瀉持續不止或更嚴重。
- (3)有血便及自發性腸道出血狀況。
- (4)使用一星期後無效。

6 包裝

140毫升以下、450毫升、3800毫升塑膠瓶裝。

7 儲存方式

請置於30°C以下貯存。

製造廠

應元化學製藥股份有限公司

台南市南區新忠路 2 6 號

藥商

應元化學製藥股份有限公司

台南市南區新忠路 2 6 號