

# 理冒伯樂止痛錠

## FUCOLE PARAN TABLETS

衛署藥製字 第 006271 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

### 【作用】

1. 當疼痛伴隨著發熱時，本藥可發揮其退熱作用而達到鎮痛、解熱的雙重功效。
2. 本藥具有鎮痛、解熱作用，對於肌肉、關節以及神經疼痛的緩解有效。

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

有效成分及含量：每錠中含：

Acetaminophen..... 500mg

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Hydroxypropylcellulose、Polyvinylpyrrolidone、Polyethyleneglycol 6000、Sodium starch glycolate、Magnesium Stearate、Magnesium Aluminosilicate、Tartrazine。

### 2 用途(適應症)

退燒、止痛（緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛）。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。

3.2.3 有肝臟疾病的人。

#### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。

#### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。

3.4.5 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。

#### 4 用法用量

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 成人及12歲以上  | 發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4-6小時可重複服用，每次1~2錠，初次應使用最小建議劑量，再視症狀增減用量。每24小時內不可超過4次。 |
| 6歲以上未滿12歲 | 適用成人劑量之1/2。                                                           |
| 3歲以上未滿6歲  | 適用成人劑量之1/4。                                                           |
| 3歲以下      | 請洽醫師診治                                                                |

#### 5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

| 身體部位 | 副作用         |
|------|-------------|
| 皮膚   | 發疹、發紅。      |
| 消化器官 | 噁心、嘔吐、食慾不振。 |
| 神經系統 | 頭暈、耳鳴。      |

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。

5.2.3 使用過量[每日超過4,000毫克(mg)]，或使用藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。

5.2.4 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

#### 6 包裝

2~1000錠塑膠瓶裝、鐵罐裝、鋁箔盒裝。

#### 7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 8 保存上之注意

8.1 本藥應置於小兒伸手不及處。

8.2 於25°C以下、避光儲存。

8.3 請在有效期限內使用。

## 9 給發燒、頭痛患者的建議

9.1 多休息、多調養及注意營養補給以提高身體卻病能力。

9.2 多飲水以補充因感冒症狀所引起之水份流失。

9.3 避免到公共場所或擁擠的地方，以免接觸更多病菌而加重病情。

9.4 適時給予藥物治療，以減輕發燒現象。

9.5 適當的服藥雖能提供症狀的部分緩解，但如果症狀仍然持續2~3天以上，就必須找醫師診斷是否患有其它併發性疾病。

## 製造廠

永信藥品工業股份有限公司台中幼獅廠  
台中市大甲區日南里工九路27號

## 藥商

永信藥品工業股份有限公司  
台中市大甲區頂店里中山路一段1191號