

PAXLOVID管灌泡製方式

2. 免責聲明：利用懸浮液管灌給予病患 Paxlovid™ 的效用並未在臨床試驗中評估，也未有相關藥物動力學研究。Paxlovid™ 中文說明書中並不推薦該方式給予藥物。

⚠ 管灌之準備及注意事項



- 鼻胃管尺寸與材質：使用 8FR 或更大管徑；PVC、silicone 或 polyurethane
- 需準備 20 ml 空針（針筒 A、針筒 B）



兩種藥物 (Nirmatrelvir、Ritonavir)
需 **分開** 製備懸浮液，
並間隔 **5 分鐘內** 服用



懸浮液在室溫下可保存 **4 小時**，
勿超過此保存時間



管灌 Paxlovid
(Nirmatrelvir/Ritonavir)
前後至少 **2 小時禁食** 任何食物

⚠ 管灌步驟

1

2

懸浮液準備

3

管灌與沖洗殘餘劑量




Nirmatrelvir 150 mg
(粉紅錠劑 2 錠)




Ritonavir 100 mg
(白色錠劑 1 錠)

錠劑
加入



磨粉
加入



針筒皆按照以下步驟執行：

1. 融於水 10 ml
吸取空氣至 15 ml
2. 上下搖晃 15 秒、
靜置 3 分鐘以利分解

⚠ 兩者藥物勿混合，前後給藥
間隔 **5 分鐘內**

1. 搖晃 1 分鐘，均勻混合
2. 給藥後，吸取 10 ml 水並上下
搖晃 15 秒，將殘藥給予完全
且將鼻胃管沖洗乾淨

Reference: Pfizer data on file

此文件為簡化流程步驟，詳細可參照完整中文文件。