

“鎰浩”

YH-UCG

優暢粒劑 U-CITRA Granules “Yihhaw”

“鎰浩”優暢粒劑是一種適味的口服全身性鹼化劑，其單劑量包裝內含檸檬酸鉀與檸檬酸，溶解後服用，本品不含糖份。

【成份】

Each package contains:

Potassium Citrate Monohydrate.....3300mg

Citric Acid Monohydrate.....1002mg

【藥理】

檸檬酸鉀被吸收後代謝成碳酸氫鉀，可作為全身性鹼化劑。是故代謝前發揮鉀之效果，代謝後檸檬酸氧化產生 HCO_3 而發揮碳酸氫之鹼性功效。於泌尿器官存有尿酸或胱氨酸結石（Cystine calculi）之病人，需長期維持鹼性尿者，本品為極有效之藥劑，尤其當其不適合攝取鈉鹽時更為有用。同時，對於痛風治療時，使用促進尿酸排泄劑（uricosuric agent）者，其為一有價值之輔助藥物，因為酸性尿易使酸鹽析出。某些腎小管障害之患者服用檸檬酸鉀以矯正其酸中毒。

“鎰浩”優暢粒劑於飯後及睡前服用可維持尿道鹼性 pH 值達 12 小時，故可省略上午 2 時之劑量。在建議劑量下，本品鹼化尿液並不會產生全身性鹼中毒。

“鎰浩”優暢粒劑是一種美味、適口，可長期服用之製劑。

【適應症】

鹼化劑（用於須長期保持尿鹼性之場合如尿道結石，腎小管性酸毒症）。

【用法用量】

單劑量包裝之內容物加入 180ml 冷開水或果汁中混合均勻後服用。一般劑量：成人每日三次，每次一包，飯後及睡前服用，可維持尿液之 pH 值為 6.5~7.4。

本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

“鎰浩”優暢粒劑對腎功能正常及尿道排出正常之患者，在建議劑量下常有良好之耐受力且無任何不適之副作用。然而對於某些腎功能異常之患者，為避免引起高血鉀或鹼中毒，應小心使用本劑。

1. 鉀中毒會引起無精打采、衰弱、神智昏眩、極度不安和其他伴隨血清中高濃度鉀所引起之症狀。故腎病患者應定期測定其血清中電解質含量，以避免此副作用發生。

2. 高血鉀引起之心電圖異常：P wave 消失，QRS 加寬與模糊，S-T 段改變，T wave 波峯加高等。

【注意事項】

1. 本劑能引起小腸之損傷而使小腸發生阻塞，出血及穿孔，如發現腹痛、腹部膨脹、噁心、嘔吐、腸胃出血時應即停止使用。

2. 尿少的患者須於醫師監視下小心使用本劑。

3. 本劑含有高濃度的鉀，須充份加水稀釋後再服用，以減少對胃腸道之傷害。每次皆於飯後服用可避免鹽類之輕瀉作用。

4. 對於具有正常鉀排泄功能之患者，口服鉀鹽甚少發生高血鉀症，然而若排泄功能不足，則可能引起高血鉀症，一旦測知發生，應立即治療，否則可引起生命問題。

5. 若發生高血鉀症時應：

(1). 減少含鉀藥物、食物之攝取。

(2). 以 10~25% 葡萄糖溶液（內含 10 unit 胰島素/20Gm 葡萄糖），每小時 300~500ml 靜脈給藥。

(3). 使用交換樹脂、血液透析、腹膜透析等。

(4). 若出現酸中毒則以碳酸氫鈉靜脈給藥以矯正之治療高血鉀症時，對於已以毛地黃達到穩定之患者，應取消使用毛地黃。因為急速降低血漿中之鉀濃度將會造成毛地黃中毒。

【禁忌】

嚴重腎臟伴隨尿少症或貧血症者，未治療之 Addison' s 症者，adynamia episodica hereditaria，急性脫水，熱痙攣，嚴重心肌損害及任何原因所引起之高血鉀症者禁用本藥。

【警語】

1. 特別對腎疾患者使用大劑量可能會引起高血鉀或鹼中毒。

2. 同時服用含鉀藥劑，鉀滯留之利尿劑及強心配劑者，可能引起毒性。

【包裝】

每包 5 公克，200 包以下鋁箔盒裝。

【儲存】

室溫（15~30℃）避光儲存。

衛署藥製字第 031113 號

製造廠：利達製藥股份有限公司

廠址：台中市大甲區中山路一段 906 號

電話：04-26872345

委託者：鎰浩貿易股份有限公司

地址：台北市松山區南京東路五段 222 號 4 樓

電話：02-27648055