



下痢治療劑

UDC-003
衛署藥製字第18620號
Code No.:32034

“永信”

安痢

膠囊

(樂必寧)

Undiarrhea

Capsules "Yung Shin"

(Loperamide)

由於腸內水分的增加，腸蠕動的異常亢進，腸的吸收作用減退，水分的自腸壁滲出，進而由肛門排泄大量之水分，以不成形糞塊之狀態而排出者即為下痢。究其原因，不外乎由於腸內細菌、寄生蟲、阿米巴原蟲等引起炎症時之腸炎性下痢；或由刺激物、過敏性物質之攝取時之過敏性下痢；或由胃酸缺乏、消化不良、脂肪類過食時之消化不良性下痢；或副交感神經異常興奮時之神經性下痢等等。對於Salmonella、Staphylococcus、Bacillus botulinus等細菌性下痢，磺胺劑、抗生物質、Berberine、Furazolidone等化學療法劑固然有其一針見血、立竿見影的效果，但這些充斥市面的化學療法劑並非下痢的萬靈丹，仍有其力所不逮的地方，比方說對於神經性下痢，它們也是束手無策，徒呼奈何；此時若能明智地選用Loperamide，則必將有意想不到的神奇效果。

Loperamide係對於腸管有特異選擇性作用之Anticholinergic agent直接作用於腸壁、拮抗腸平滑肌之異常收縮、抑制腸壁之過度蠕動，而對於中樞神經系統則無任何作用；Loperamide即以其作用獨特，藥力強勁、藥效迅速、效果卓著、適應範圍廣、可配伍性高、耐受性良好、使用之伸縮性大與異軍突起，在七十年代的醫藥界名噪一時，並以黑馬的姿態而廣受注目與實用。

【成分】 每膠囊中含：

Loperamide Hydrochloride.....2mg

【特徵】

1. 本藥直接作用於腸壁，可有效地拮抗腸平滑肌之異常收縮、抑制腸壁之過度蠕動，其對小腸、大腸的作用遠大於胃、肝膽道及其他泌尿生殖系統之作用，為腸管之特異選擇性作用之Anticholinergic agent。
2. 本藥對於中樞神經系無任何作用，故不似Atropine，小劑量時可興奮延髓中樞而大劑量時反而抑制之雙相現象殆不發生。
3. 本藥對於由腸胃炎、飲食、功能性異常所引起之腹瀉，本藥均能迅速緩和其下痢，堪稱為藥力強勁、藥效迅速而又持久的理想藥物。
4. 本藥除了可迅速解除下痢所引起之不適，終止急性下痢的症狀而使腸之排便機能正常化；對於慢性下痢患者，也可幫助其糞便之稠化而解出成形之糞便；對於放射性療法或其他各種原因所致之慢性下痢，以及其他各種藥物不能奏效之下痢，本藥往往都有優越的效果。
5. 本藥可與磺胺劑、抗生物質、Berberine、Furazolidone等化學療法劑、類固醇類、精神安定劑、收斂劑、吸著劑等合併使用而不妨礙其效果。
6. 本藥之使用迥異於其他藥物一天3~4次之傳統給藥法，由病人於每次下痢後投藥一粒之斟酌病情給藥法，除了可確實控制病情之外，並可免除其他同類製劑所可能引起之便秘、腹脹等現象。
7. 本藥對於消化不良、食物過敏、腸胃炎、藥物所引起之急性下痢；吸收障礙、結腸炎、放射性療法、結腸激躁症候群、阿米巴赤痢後之下痢等慢性下痢均極適用之。
8. 本藥耐受性良好，以常用劑量使用下，幾乎所有的患者都能成功地治癒其下痢而不需要中途停藥。

【適應症】

下痢（細菌性、阿米巴性痢疾）。

【用法·用量】

通常成人之初劑量為2粒，如再下痢則每次下痢後加服1粒，以每天8粒，連用5天為準；小兒之初劑量為1粒，如再下痢則每次下痢後加服1粒，依照年齡、體重以每天4~6粒為準。
本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 本藥使用勿超過兩天，若須長期投藥，應在每次常規性門診時，檢查其病情是否有進展。
2. 在投藥後數天，下痢症狀仍無法停止，或有發燒現象出現時，應請醫師做進一步檢查。
3. 副作用：
投與本藥期間，罕有脹氣、便秘、食慾喪失、噁心、嘔吐、胃痛、皮疹、思睡或暈眩、口乾等現象。
4. 禁忌症：對本藥過敏既往例患者。
5. 孕婦之安全性未確立，故宜權衡利弊，再行投與。
6. 兩歲以下之孩童，不推薦使用，除非已諮詢醫師同意。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 室溫（15~30℃）、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

16~1000粒瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2142104