



# 維骨力加強型口服溶液用粉劑

## VIARTRIL-S POWDER FOR ORAL SOLUTION

衛署藥輸字第 023724 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2025-08-08

### 藥品特性

#### 【概說】

維骨力(Viartril-S)的主要成分為硫酸鹽葡萄糖胺(Glucosamine Sulfate Sodium Chloride)，是由右旋硫酸鹽葡萄糖胺和氯化鈉化學合成的，為骨有機質、骨間質及關節內、外組織之重要成分。一般病理學上認為，若硫酸鹽葡萄糖胺的新陳代謝作用發生障礙或不平衡，可能造成骨關節病變。有研究實驗指出，患有慢性關節炎的病人每天適量補充硫酸鹽葡萄糖胺可幫助刺激及復原關節軟骨的新陳代謝。

#### 【藥理作用】

硫酸鹽葡萄糖胺口服後經血液吸收，最後滲透進入關節腔中，約有15小時的長效作用。其藥理作用如下：

#### (A)骨關節之營養及促進新陳代謝作用

--黏多醣為軟骨組織的主要成分，硫酸鹽葡萄糖胺能促進黏多醣合成，同時也能促進間骨組織合成。

#### (B)潤滑作用

--硫酸鹽葡萄糖胺能改善滑囊液的黏性、增加滑囊液的產生。

維骨力對退化性骨關節特別有效，能:(a)減少骨關節疼痛(b)改善骨關節機能(c)抑制關節退化並具復原作用。

## 1 成分

### 1.1 有效成分及含量

每小包含：

有效成分及含量：硫酸鹽葡萄糖胺(Glucosamine Sulfate Sodium Chloride)1884毫克相當於Glucosamine Sulphate 1500毫克和Sodium Chloride 384毫克。

### 1.2 其他成分(賦形劑)

Aspartame、Sorbitol、Macrogol 4000、Citric acid。

## 2 用途(適應症)


緩解退化性關節炎之疼痛。

## 3 使用上注意事項

請詳閱說明書後依指示使用。

### 3.1 有下列情形者，請勿使用

#### 3.1.1 對葡萄糖胺過敏的人。



3.1.2 有苯酮酸尿症(phenylketonuria)的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

嚴重肝腎疾病的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

未滿18歲、孕婦、可能懷孕婦女、哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 維骨力為病因治療，必須從開始治療後約一星期之後才有明顯的治療效果，因此當病情嚴重時，可從開始治療的第一天起，同時使用抗發炎藥品治療。

3.4.2 請勿超過建議使用量。

3.4.3 請勿使用過期產品。

3.4.4 正確的儲藏環境及保持完整的產品包裝，才能確保保存期限內的藥品有效。

3.4.5 為防止兒童誤食，請妥善保管。

3.4.6 藥品應避免放置陽光直射或高溫，宜保存於室溫25°C以下乾燥的地方。

#### 4 用法用量

| 適用對象           | 使用劑量與頻次                        | 治療期間                |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 18歲以上，有關節炎症狀的人 | 每天服用一包(溶於一杯水，約100c.c.)，與餐併服較佳。 | 至少3個月。每隔兩個月可重複一次療程。 |

#### 5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

| 身體部位 | 副作用                            |
|------|--------------------------------|
| 皮膚   | 過敏反應，如：紅、腫、癢或起疹子               |
| 腸胃   | 覺得胃不舒服、胃痛、脹氣、便秘、拉肚子、消化不良、噁心、嘔吐 |

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

過敏反應、伴隨搔癢和紅斑的皮膚性出疹。

#### 6 包裝

114.08.08

2 ~ 500小包盒裝。

版本 CCDS 20240620-1



製造廠

ROTTAPHARM LTD.

DAMASTOWN INDUSTRIAL PARK, MULHUDDART, DUBLIN  
15, IRELAND

藥商

電話

0800-616-868

台灣邁蘭有限公司

臺北市信義區信義路 5 段7號27樓