



抗濾過性病毒劑

VLT8-004
衛署藥製字第039368號
Code No.:38245

“永信”

剋 庖

錠 800公絲

(艾賽可威)

Virless

Tablets 800mg "Yung Shin"

(Acyclovir)

3.98cm



病毒對於自然界中不論動物、植物及人類而言，都是相當令人困擾的小東西，其頑強的生命力及致病力幾乎讓人有束手無策之感。

永信剋庖錠，乃為濾過性病毒的剋星，其主成分Acyclovir，對於被病毒感染的細胞而言，深具理想的治癒效果，且經本公司不斷的處方研究及測試才得以研製成功，祈盼能為臨床上受病毒感染的患者提供一種安全的治療選擇。

【成 分】每錠中含：

Acyclovir.....800mg

【賦 形 劑】

Potato Starch、Microcrystalline Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Brilliant Blue FCF、Magnesium Stearate。

【作 用】

1. 本藥能選擇性的作用於受Virus（病毒）感染的細胞上，因Acyclovir要產生抑制病毒DNA合成的作用前，必須先被磷酸化(Phosphorylation)轉變成Acyclovir Triphosphate，而此磷酸化的第一步須在病毒本身所特有之Thymidine Kinase存在之下才得以進行，故對於未受病毒感染的正常細胞則不會發揮作用。
2. 本藥毒性低且具選擇性，故可安全及有效地治療病毒性感染症。
3. 本藥可阻止病毒在寄主細胞中複製，而加速病情的痊癒及疼痛的緩解。
4. 本藥主要經由腎臟排泄，約60%以原型排泄於尿中，並於全身各組織的分佈性良好，又可通過血腦障壁，故對於病毒性腦膜炎亦具有治療效果。
5. 本藥經生體外試驗，對於單純庖疹病毒Type I、Type II及水痘帶狀庖疹病毒均具有很高的抗病毒活性，而且對哺乳動物的毒性極低。

【適 應 症】

帶狀庖疹病毒引起之感染、單純庖疹病毒引起之皮膚及粘膜感染、預防骨髓移植及白血病所引起之免疫不全病人之單純庖疹感染、復發性單純庖疹感染之抑制、水痘之感染。

【用法・用量】

一般劑量為每次800mg（一錠），一天5次，連用7~10天。
本藥須由醫師處方使用。

【禁 忌 症】

曾對本藥產生過敏病歷之患者禁用之。

【一 般 注 意】

1. 請確實依指示之用法用量使用。
2. 接受本藥治療期間，應注意病灶之病情傳染。
3. 嚴重免疫機能不全之患者，長期或重複投與本藥，可能會誘發抗藥性病毒之生成，而使持續性治療之功效不彰。
4. 正接受其他具有腎毒性藥物治療之患者，應小心使用本藥。
5. 本藥無法驅除潛伏性之病毒。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥使用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副 作 用】

短期治療單純庖疹期間，最常發生之不良反應包括：噁心、嘔吐及頭痛。而其他較罕見之副作用包括：下痢、眩暈、食慾不振、疲勞、水腫、皮膚疹、腿痛、腹股溝腺病、藥味及喉嚨痛等。長期治療則以噁心、下痢、頭痛及皮膚疹最為常見。
治療帶狀庖疹期間，可能發生之副作用包括：不適、噁心、頭痛、嘔吐、下痢、便秘及噁心等。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】

10~1000錠鋁箔盒裝、瓶裝。



YUNG SHIN®

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2148790

