

Ozempic inj 不同劑量施打方式



Ozempic 本院劑型 4mg/3ml 是給固定在使用的病人，刻度標示僅有『0』直接到『1』

病人劑量施打 0.25

排空線後，轉 18 個響聲。

病人劑量施打 0.5

排空線後，轉 36 個響聲。

排空線



建議衛教病人時，轉好後用不同顏色油性筆作記號。

讓病患開始有彈性、每週一次的 Ozempic®¹

初始劑量	提高劑量	維持劑量
0.25 mg 持續 4 週*	0.5 mg 至少 4 週	0.5 mg 或 1 mg 根據個人血糖控制狀況

正確地開始患者的療程 – 初始以 0.25 mg 治療 4 週，接著再以 0.5 mg 治療 4 週

每週給藥一次
不論是否進食

Ozempic® 0.25 mg
每週一次，治療 4 週

Ozempic® 0.5 mg
每週一次，治療 4 週

可重複使用的預充填注射筆

*每個 Ozempic® 包裝中皆附有 NovoFine® Plus 4-mm 針頭 – 這是每週一次 GLP-1 受體促效劑中所使用最細的針頭¹⁴

*The starting dose of 0.25 mg is not a maintenance dose and is intended to help patients adjust to treatment.
Reference: 1. 請參閱注射劑藥物之說明書或變更

novo nordisk

OZEMPIC
semaglutide injection