

Vancouver 125 mg (凡可復 125 mg 膠囊)
調配流程
(for 管灌病人)

Report Number: -

1 產品外觀

Vancouver 125 mg (凡可復 125 mg 膠囊) 為熱熔配方充填於 2 號膠囊，膠囊身為淡黃色，膠囊蓋為藍色，內容物在室溫下為淡粉紅色硬塊、子彈狀，沒有黏性 (圖一)。




圖一、Vancouver 125 mg (凡可復 125 mg 膠囊) 內容物外觀

2 Vancouver 125 mg (凡可復 125 mg 膠囊) 溶解步驟

- 2.1 破碎膠囊內容物：將整顆膠囊成品（不需去除膠囊殼）放入有蓋之乾淨與乾燥的研鉢或塑膠袋內，並以乾淨與乾燥的研杵（或硬質工具）敲碎或敲扁膠囊成品（若是使用塑膠袋，在敲擊膠囊成品之前，需在塑膠袋上覆蓋一層布或數層紙，避免塑膠袋破裂），過程中勿讓膠囊成品沾到水。當內容物碎裂成越小塊（圖二與圖三），表面積越大，相對地縮短成品的溶解時間。



*如無法破碎膠囊殼，只要確定有把內容物敲扁即可。



圖二、以研杵敲碎研鉢內的膠囊



圖三、以研杵敲碎塑膠袋內的膠囊

- 2.2 膠囊溶解：將敲扁或敲碎的膠囊成品（不超過 2 顆膠囊）收集放入小藥杯或是紙杯，將至少 10 mL 溫度約 45-60°C 的飲用水倒入杯子，溫度不超過 70°C，並以不鏽鋼筷子攪拌直到淡粉紅色內容物溶解、目視無殘留為止（圖四）。若有將內容物敲成小碎片並持續攪拌，膠囊殼與內容物可於 5-10 分鐘之內溶解。若需服用到 4 顆膠囊，則建議以至少 20 mL 飲用水溶解膠囊。



圖四、Vancouver 125 mg (凡可復 125 mg 膠囊) 完全溶解的狀態

- 2.3 膠囊投入飲用水之後的 1 小時內需投予服藥者。