

本院非固醇類抗發炎藥（NSAIDs）藥品清單

115. 03. 03

院內碼：OVOR ATC碼：M01AB05	品名：VOREN EMC 50MG CAP 中文品名：非炎腸溶微粒膠囊 適應症：緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛 副作用：胃腸不適、頭昏、過敏、耳鳴 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。若出現黏膜破裂等副作用，請立即停藥回診。 進行冠狀動脈繞道手術CABG之後14天禁止使用本藥。 注意事項：SJS風險藥物，一日極量:100mg
院內碼：EVOT ATC碼：M01AB05	品名：VOTALIN 栓劑 12.5MG SUPP 中文品名：普他寧栓劑 適應症：退熱（體溫38.5度以上使用；肛門栓劑），緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛 副作用：腸胃不適、頭痛(暈)、紅疹 禁忌：1. 有消化性潰瘍者慎用；2. 肛門塞劑；3. 請勿置於高溫下, 使用前請將包裝剝開；4. 對Diclofenac、Aspirin或其他NSAIDs過敏反應患者不適用
院內碼：OPIN ATC碼：M01AB08	品名：PINTON SR 400MG TAB 中文品名：平痛持續性藥效錠 適應症：類風濕性關節炎、骨關節炎。 副作用：胃腸不適、紅疹、頭昏眼花 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。若出現黏膜破裂等副作用，請立即停藥回診。 注意事項：注意>60歲骨關節炎, 合併消化性潰瘍等限制
院內碼：OACEM ATC碼：M01AB11	品名：ACEMET 60MG CAP 中文品名：艾斯美特膠囊 適應症：風濕性關節炎、退化性關節炎(骨關節炎)、僵直性脊椎炎、痛風、肌肉炎、腱鞘炎、滑囊炎 副作用：胃腸不適, 頭昏眼花, 若出現黏膜破裂等副作用，請立即停藥回診。 禁忌：胃腸潰瘍、血液障礙、14歲以下的孩童不建議使用。對Aspirin, Indomethacin過敏者不可使用。 注意事項：對aspirin過敏者不可使用
院內碼：IKETO ATC碼：M01AB15	品名：KETO 30MG/1ML INJ 中文品名：克多炎注射液 適應症：短期(≤5天)使用於緩解無法口服病人之中重度急性疼痛，通常使用於手術後， 副作用：暈眩、頭昏、嗜睡、紅疹 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。曾因服用Aspirin或其他非類固醇消炎劑引起過敏者需注意。IV時間需大於15s 注意事項：不可用於退燒, 單日極量為120MG。施打後須觀察病人狀況30分鐘。
院內碼：OPAINOF ATC碼：M01AB15	品名：PAINOFF EMC 10MG CAP 中文品名：痛諾伏腸溶微粒膠囊 適應症：疼痛之短期療法。 副作用：暈眩、頭昏、嗜睡、紅疹。若有嘴巴破喉嚨痛等症狀請立即停藥回診 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。不可用於退燒，且禁止用於產科相關止痛、對ASPIRIN或NSAID過敏者。 注意事項：不可用於退燒, 禁用於對ASPIRIN過敏者
院內碼：OTONE ATC碼：M01AB16	品名：ToNeC 痛停錠 100MG TAB 中文品名：痛停錠 適應症：治療退化性關節炎、類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎所引起之疼痛及發炎症狀 副作用：消化不良、腹痛、腹瀉、噁心 禁忌：有胃腸出血病史不建議使用。若有嘴巴破，喉嚨痛等症狀請立即停藥回診。
院內碼：OMOPI ATC碼：M01AC06	品名：MOPIK 15MG TAB 中文品名：莫比克錠 適應症：類風濕性關節炎、骨關節炎及僵直性脊椎炎之症狀治療 副作用：腹部不適，腹痛，便秘，腹瀉，腸胃脹氣，消化不良，噁心，嘔吐，頭暈，頭痛。 禁忌：禁用於活動性發炎性腸道疾病【克隆氏病(Crohn' s Disease)或潰瘍性結腸炎】、小於12歲的患者。若有嘴巴破，喉嚨痛等症狀請立即停藥回診。禁用於治療冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG) 前中後之疼痛，且術後14天內禁用本藥。 注意事項：1日極量15mg

院內碼：IIBU01 ATC碼：M01AE01	品名：IBUFOR 400MG/100ML INJ 中文品名：益百熱預混合注射液 適應症：鎮痛, 退燒 副作用：心肌梗塞、中風、胃腸潰瘍、出血、皮膚不良反應如 SJS 禁忌：活性消化性潰瘍、出血或穿孔者；對ibuprofen過敏；嚴重出血傾向者；嚴重肝衰竭；嚴重腎衰竭；服用aspirin或NSAID過敏者注意使用。 輸注時間需大於30分鐘。進行冠狀動脈繞道手術(CABG) 之後14天內禁用本藥 注意事項：致畸作用-妊娠30週前：妊娠C類；妊娠30週開始：D類
院內碼：OIDOF ATC碼：M01AE01	品名：IDOFEN 20MG/ML 60ML SUSP 中文品名：舒抑痛口服懸液 適應症：消炎、鎮痛、解熱。 副作用：胃腸不適、紅疹、頭昏、耳鳴 禁忌：1. 有消化性潰瘍者慎用。2. 服用aspirin或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹或其他過敏反應者，或逕行冠狀動脈繞道手術後14天內者不可使用本品。
院內碼：ONA250 ATC碼：M01AE02	品名：NAPROXEN 250MG TAB 中文品名：那普洛先錠 適應症：關節炎等之消炎、鎮痛、解熱。 副作用：水腫，呼吸困難，瘀斑，腹痛，便秘，頭暈，耳毒性，呼吸困難 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁用本藥。 Aspirin 或其他種非類固醇消炎劑引發氣喘、鼻炎、蕁麻疹者，最好改用他類製劑。 注意事項：懷孕等級:D
院內碼：IKET ATC碼：M01AE03	品名：KETOPROFEN 50MG/2ML INJ 中文品名：可多普洛菲肌肉注射液 適應症：消炎、解熱、鎮痛（風濕性關節炎、骨關節炎、強硬性脊椎炎及痛風、腰酸背痛以及手術外傷後之疼痛）。 副作用：休克、噁心、嘔吐、胸悶、Lyell症候群(中毒性表皮壞死症)，注射部位疼痛或硬結。 禁忌：1. 有消化性潰瘍之患者及其既往歷有蕁麻疹、過敏、休克之患者請小心使用。 2. 血液異常、肝障礙、腎障礙、心臟機能不全的患者. 對aspirin過敏者. Neuquinone類抗菌劑 注意事項：此藥僅能IM使用！
院內碼：IKET01 ATC碼：M01AE03	品名：KETOFEN克痛炎50MG/2ML INJ 中文品名：克痛炎肌肉注射液 適應症：消炎、解熱、鎮痛 副作用：可能有輕之胃腸障礙，及GOT、GPT值上昇。偶有思睡、發疹搔癢、口渴及搖晃感 禁忌：1. 有消化性潰瘍之患者及其既往歷有蕁麻疹、過敏、休克之患者請小心使用。 2. 進行冠狀動脈繞道手術（Coronary artery bypass graft, CABG）之後14天內禁用本 注意事項：此藥僅能IM使用！懷孕20週以上孕婦不可使用。
院內碼：OLEF ATC碼：M01AE09	品名：LEFENINE 100MG TAB 中文品名：利菲炎膜衣錠 適應症：下列疾患及症狀之鎮痛、消炎：慢性關節炎、變形性關節症、腰痛症、齒髓炎、根膜炎、經痛、手術後鎮痛、消炎 副作用：消化不良、胃腸不適、頭暈、視覺模糊、胃腸潰瘍 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。若有嘴巴破，喉嚨痛等症狀請立即停藥回診。 對本藥、阿斯
院內碼：OCEC ATC碼：M01AH01	品名：CECOLEX 希骨樂 200MG CAP 中文品名：希骨樂膠囊 適應症：緩解骨關節炎之症狀與徵兆，緩解成人類風濕性關節炎之症狀與徵兆，緩解成人急性疼痛及治療原發性經痛，緩解僵直性脊椎炎之症狀與徵兆。 副作用：背痛、末梢水腫、眩暈、頭痛、失眠、胃腸不適 禁忌：1. 有消化性潰瘍者慎用。 2. 禁用於對本藥有過敏反應之患者。 3. 若有嘴巴破，喉嚨痛等症狀請立即停藥回診。 注意事項：aspirin或sulfonamides過敏的病人。14天內進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)病人禁用此藥

院內碼：OCELE2 ATC碼：M01AH01	品名：CELEBREX 希樂葆 200MG CAP 中文品名：希樂葆膠囊 適應症：解熱、鎮痛、抗發炎 副作用：背痛、末梢水腫、眩暈、頭痛、失眠、胃腸不適 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。對磺醯胺 (sulfonamides), aspirin有過敏反應之患者不適用。若有嘴巴破，喉嚨痛等症狀請立即停藥回診。 注意事項：aspirin或sulfonamides過敏的病人。14天內進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft)病人禁用此藥
院內碼：IDYC01 ATC碼：M01AH04	品名：DYCOX 40MG LY0-INJ(自費) 中文品名：術適得凍晶注射劑 適應症：短期(不宜超過四天)使用於外科手術後疼痛之緩解。 副作用：噁心、腹痛 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。若出現皮疹、黏膜病灶或其他過敏徵象就該立即停止使用。具心血管風險。本藥使用不宜超過4天。 注意事項：自費品項，需填同意書(勿使用超過4天)
院內碼：IDYN ATC碼：M01AH04	品名：DYNASTAT 40MG INJ(自費) 中文品名：得術泰注射劑 適應症：短期(不宜超過四天)使用於外科手術後疼痛之緩解。 副作用：1. 若出現皮疹、黏膜病灶或其他過敏徵象就該立即停止使用。2具心血管風險 禁忌：有消化性潰瘍或腸胃道出血，孕婦，哺乳者不可使用。僅能與N/S 0.9%、或D5W、或Dextrose 5% in sodium chloride 0.45%混合，禁與其餘成分稀釋液(含管路)混合使用!!! 注意事項：自費品項，需填同意書(勿使用超過4天)
院內碼：OECOX ATC碼：M01AH05	品名：ECOXIA 60MG TAB 中文品名：易克適膜衣錠 適應症：骨關節炎(OA)與類風濕性關節炎(RA)之表徵與症狀的急慢性治療、治療急性痛風性關節炎、治療原發性經痛、治療僵直性脊椎炎、治療牙科手術後疼痛、治療婦科手術後疼痛 副作用：虛弱疲倦、眩暈、下肢水腫、高血壓、消化不良、胃灼熱、噁心、頭痛、肝指數升高 禁忌：有消化性潰瘍者慎用。對本品之任何成分過敏。充血性心衰竭(NYHA II-IV)者不可使用。
院內碼：OLABU ATC碼：M01AX01	品名：LABUTON 500MG TAB 中文品名：樂不痛膜衣錠 適應症：退化性關節炎、風濕性關節炎之消炎鎮痛 副作用：搔癢、腹痛、腹瀉、水腫、頭昏、耳鳴 禁忌：禁用於活動性消化性潰瘍、嚴重的肝臟受損、以及對此藥過敏者。 注意事項：注意>60歲骨關節炎, 合併消化性潰瘍等限制