

國軍高雄總醫院需使用輸液幫浦之藥物明細表 2026.06.29

院內代碼	院內品項	ATCCODE	成分名	可相容的輸注液	給藥濃度	常見臨床輸注速率範圍	藥品類別/ISMP's
IHUMR	HUMuLin- 【R】 (瓶)1000U/10ML	A10AB01	Regular Insulin	NS	0.05 - 1 unit/mL	依血糖調整	Insulin, subcutaneous and IV
IVAXC	VAXCEL HEPARIN SODIUM 5000IU/ML 5ML INJ	B01AB01	Heparin	NS	20000 - 40000 unit to 1000 mL NS	Initial 5000 unit, then 20000-40000 uint/24hr	Antithrombotic agents
IPOT	KCL inj 15% 750mg/10mEq/5ml	B05XA01	Potassium Chloride	必須加入 D5W 或 NS 內充分混勻，禁止原液給藥	周邊導管: 10 - 40mEq/L，最高 60 - 80 mEq/L 中央導管: 最高 200 mEq/L	10 - 20 mEq/hr，>20 mEq/hr需中央靜脈導管，K-blood < 2 mEq/L時，最高 40 mEq/hr(僅限ICU且連續 ECG Monitoring) (MAX:400 mEq in 24 hours)	Potassium chloride
IMGSU	MgSO4.10% 2000mg/20ml	B05XA05	Magnesium Sulfate	D5W, NS	需小於20%或更低才能給藥	靜脈注射速率不應超過150 mg/min(相當於10%溶液1.5 mL/min)。 子癲前症或子癲：初始劑量：4 g MgSO4加入250 mL稀釋液中靜脈輸注，或10% MgSO4溶液 40 mL在3-4分鐘內靜脈注射4 g 維持劑量：初始劑量後以 1 - 2 g/hr持續靜脈輸注。 最大劑量限制：每日總劑量不得超過30-40 g，嚴重腎功能不全	Magnesium sulfate injection
ILI	LIDOCAINE 2% 5ML INJ	C01BB01	Lidocaine	D5W	infusion/D5W: 0.4%; 4 mg/mL or 0.8%; 8 mg/mL	Infusion:1-4 mg/min 約 20 - 50 mcg/kg/min	Antiarrhythmics, IV
ICORA	CORDARONE 150MG/3ml	C01BD01	Amiodarone	建議使用D5W	1-6 mg/mL，濃度大於2 mg/mL時應使用中央靜脈導管	起始劑量：5 mg/kg，溶解於葡萄糖溶液中。在20分鐘至2小時時間內靜脈輸注給藥，可每二十四小時重複注射二至三次。 維持劑量：日劑量一般依體重10-20 mg/kg計算(通常600至800mg/24小時，至多1.2g/24 小時)，配以250 mL 葡萄糖溶液，輸注數天。	Antiarrhythmics, IV
INOREP	NOREPINEPHRINE VIAL 4MG/4ML INJ	C01CA03	Norepinephrine	D5W (首選，避免氧化)	4 mcg/mL或更高	開始時每分鐘 2~3 mL (8~12 mcg Norepinephrine) 觀察病患反應後，調整流速維持低的正常血壓 (通常收縮壓為 80~100 mmHg)。過去有高血壓的病史患者，血壓不應超過以前的收縮壓以下 40 mmHg，平均維持劑量是每分鐘 0.5~1 mL (2~4 mcg Norepinephrine)。	Adrenergic agonists,IV
IGIP	GIPAMINE 600MG/200ML	C01CA04	Dopamine	D5W	3 mg/mL	初始劑量1~ 5 mcg /kg/min，依狀況可最高20 mcg/kg/min (依血壓調整)	Adrenergic agonists,IV
IGEND	GENDOBU INJ.250MG/20ML	C01CA07	Dobutamine	D5W, NS	500 - 5000 mcg/mL	初始流速 0.5 - 1 mcg/kg/min，2.5 - 20 mcg/kg/min (最高可至 40)	Adrenergic agonists,IV
IEPIR	EPIRENAMIN 1MG/1ML	C01CA24	Epinephrine	D5W	1 mcg/mL(1vial (1 mg/mL) 加入 1000 mL D5W)	Adult: 0.05 - 2 mcg/kg/min，每10-15分鐘調整一次，每次增加 0.05 - 0.2 mcg/kg/min children(initiate) : 0.1 mcg/kg/min The maximum rate is 10 mcg/min	Adrenergic agonists,IV
IMIL INTG	MILLISROL 5MG/10ML N.T.G. PREMIXED INJECTION 50MG/250ML/Bot	C01DA52	Nitroglycerin (NTG)	D5W, NS	0.05 - 0.4 mg/mL	5 - 500 mcg/min (從低劑量開始調滴)，初始滴定應為 5 微克/分，每隔 3 至 5 分鐘增量。如果在 20 微克/分沒有觀察到反應，可以增量 10，甚至 20 微克/分。一旦可觀察到血流動力學反應，劑量遞增應更小，更少頻率。	Cardioplegic solutions
ICHEN	CHENDAY 25MG/5ML	C07AG01	Labetalol	D5W, NS	1 mg/mL(200 mg to 160 mL)或2 mg/3mL(200 mg to 250 mL)	初始速率為 2 mg/min (可依血壓反應調整) > 2min	Adrenergic antagonists,IV
INIM	NIMBEX 2MG/ML 5ML INJ	M03AC11	Cisatracurium	D5W, NS	0.1 mg/mL	ICU患者使用量 起始劑量: 3 mcg/kg/min，隨著時間增加或減少 維持劑量範圍: 0.5 - 10.2 mcg/kg/min	Neuromuscular blocking agents
IFRE IANES	Fresofol 【1%】 20ML ANESVAN 10MG/ML 【50ML】	N01AX10	Propofol	原液不稀釋 (或限用 D5W 稀釋)	通常不稀釋(10 mg/mL)	全身麻醉之維持: 4-12 mg/kg/hr通常可維持理想麻醉效果 加護照護之鎮靜作用: 0.3-4 mg/kg/hr 12 小時後輸注系統需更換	Anesthetic agents

註：NS:Normal saline (Sodium chloride 0.9%), D5W:Dextrose 5% in water

Reference:

- 藥品仿單
- Micromedex
- ASHP Injectable Drug
- FDA DRUG LABEL